

*Гудач В. А., Линник Е. А.*  
**ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  
**ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ**  
*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Безводицкая А. А.*  
*Кафедра общей хирургии*  
*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** В настоящее время в нашей стране в общей популяции послеоперационные грыжи прочно удерживают второе место после паховых, составляя при этом от 25 до 30,7%. В 1-ом хирургическом отделении 5 ГКБ этот процент за 2012 г. составил – 24%, за 2013 – 25%.

**Цель:** проанализировать ситуацию по частоте возникновения послеоперационных вентральных грыж в 1-ом хирургическом отделении 5 ГКБ, изучить причины их возникновения, определить группу риска возникновения этой патологии.

**Материал и методы.** Проведено ретроспективное исследование 42 историй болезней пациентов, находившихся в стационаре 1-ого хирургического отделения 5-ой ГКБ за 2012-2013 гг. по поводу лечения послеоперационных вентральных грыж. Проведено анкетирование 31 пациента с целью выяснить мнение пациентов о причинах возникновения у них грыжевого выпячивания передней брюшной стенки.

**Результаты.** Проведен анализ полученных данных. Женщин было 71,5%, мужчин 28,5%. По возрастным группам больные распределились следующим образом: 30-50 лет – 17%, 51-60 лет – 28%, 61-70 лет – 38%, старше 71 года – 17%. У 74% больных была в анамнезе сопутствующая сердечно-сосудистая патология. 85% пациентов страдали повышенной массой тела.

Пациенты страдали послеоперационными грыжами после следующих оперативных вмешательств: холецистэктомия – 31%, аппендэктомия – 14%, грыжесечение – 17%, другие лапаротомические операции – 38%.

Проведен анализ анкет.

**Выводы:**

1. Наиболее подвержены возникновению ПОВГ женщины.
2. Основную группу риска составляют люди пожилого и старческого возраста (более 60 лет), имевшие лапаротомическую операцию, с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и избыточной массой тела.
3. К факторам риска возникновения ПОВГ можно отнести постоянные физические нагрузки, воздействие стрессовых факторов, проведение лапаротомической операции.
4. Чаще всего ПОВГ возникают в периоде от 5 до 10 лет после операции.