

Марочкина Т. Н.
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Семенчук И. Д.

Кафедра общей хирургии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Острый аппендицит является одним из наиболее частых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Установление диагноза острого аппендицита служит показанием к срочному оперативному вмешательству. Однако нередко диагностика острого аппендицита достаточно сложна; многие заболевания органов брюшной полости и малого таза могут имитировать клиническую картину острого аппендицита.

Кроме того, за последние 10 лет частота аппендицита увеличилась в 2-3 раза, а численность пациентов составила 25-30% от всех хирургических.

Цель: проанализировать качество медицинской службы на этапе постановки диагноза и оказания экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением на острый аппендицит.

Задачи:

1. Изучить структуру заболевания острым аппендицитом в первом хирургическом отделении 5-й ГКБ;
2. Проанализировать тактику ведения пациентов, поступивших с подозрением на острый аппендицит;
3. Оценить результаты оперативного лечения.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили истории болезней 150 пациентов (у 101 подтвердился диагноз аппендицита), находившихся в 1-ом хирургическом отделении 5-ой городской клинической больницы г. Минска.

Выводы:

1. Среди пациентов, у которых подтвердился диагноз острый аппендицит, преобладают лица женского пола (55,3%).
2. Аппендицит - заболевание молодого и среднего возраста.
3. На этапе приемного отделения диагностика пациентов основывалась на жалобах, лабораторных показателях, показателе температуры.
4. Несмотря на современный этап развития эндовидеохирургии, в 5-ой ГКБ основным методом лечения острого аппендицита является классическая аппендэктомия.
5. Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 35,6 мин.
6. Среднее количество койко-дней составило 5.
7. Послеоперационная летальность составила 0 %, частота послеоперационных осложнений 2 %.