

Секерджицкая Е. А., Статкевич А. И.
**ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я.
Кафедра общей хирургии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. За последние десять лет в Республике Беларусь число ежегодно регистрируемых случаев заболевания раком молочной железы увеличилось в 1,4 раза (зарегистрировано 2886 случаев 2001 году, 3948 – в 2010 году). Частота диагностики рака в 3 и 4 стадии все так же остается высокой, поэтому изучение факторов, которые могли бы повлиять на диагностику рака молочной железы в ранних стадиях является актуальной проблемой.

Цель: изучить факторы, влияющие на диагностику рака молочной железы в различных стадиях.

Материал и методы. В основу работы положен ретроспективный анализ медицинских карт 103 пациентов с раком молочной железы, находившихся на лечении в Вилейском онкологическом диспансере в 2012-2013 году.

Результаты. Основную группу составили 63 (61,2%) пациентки с 3 – 4 стадией рака молочной железы, в группу сравнения включены 40 (38,8%) пациентов с 1 – 2 стадиями рака молочной железы.

При анализе установлено, что в основной группе городскими жителями были 33 (52,4%), сельскими – 30 (47,6%), трудоспособными – 11 (17,5%), нетрудоспособными – 52 (82,5%) пациенток. В фертильном возрасте пролечено 3 (4,8%) пациентки, старше 45 лет – 60 (95,2%). При изучении особенностей метастазирования установлено, что в кости скелета было: 33 (60,0%), легкие 9 (16,4%), печень 7 (12,7%), головной мозг 3 (5,5%), яичники 1 (1,8%), другую молочную железу 1 (1,8%), кожу 1 (1,8%) случаев.

В группе сравнения городские жители составили 18 (45,0%), сельские – 22 (55,0%), трудоспособные – 4 (10,0%), нетрудоспособные – 36 (90,0%) пациенток. В фертильном возрасте пролечено 1 (2,5%), старше 45 лет – 39 (97,5%) пациенток.

В этой группе метастазы обнаружены в 19 (47,5%) случаях в надключичных лимфоузлах, у 3 (7,5%) – в узлах средостения и у 18 (45,0%) отсутствовали.

Выводы:

1. Преобладание 3-4 стадии рака молочной железы среди городского населения требует улучшения организационных мероприятий по выявлению рака молочной железы, особенно в возрасте старше 45 лет.

2. Осведомленность врачей первичного звена о частом метастазировании в ранних стадиях в надключичные лимфоузлы может быть важным клиническим фактором.