

Бондарь С. Ю., Агаларова А. Г.
**АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ ЗА 2006-2012 ГОДЫ**

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Навроцкий А. Л.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Цель: провести ретроспективный анализ заболеваемости сифилисом в Республике Беларусь за 2006-2012 годы.

Материал и методы. Источником данных выступали амбулаторные карты и истории болезни пациентов Минского городского клинического кожно-венерологического диспансера (МГККВД) за 2006-2012 годы, а также официальная статистическая отчетность МГККВД за аналогичный период времени. В качестве методов исследования был использован ретроспективный статистический анализ, а также методы вариационной статистики.

Выводы:

1. Заболеваемость сифилисом в Республике Беларусь за период с 2006 по 2012 гг. снизилась в 2,6 раза, в том числе больше всего в Могилевской области – в 4,1 раза.

2. Впервые с начала 90-х годов количество вновь выявленных больных сифилисом снизилось менее 1000 случаев. В 2012 году в целом по РБ было зарегистрировано 977 больных, что составило 10,3 случая в расчете на 100 тыс. населения. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдался в Гомельской области (17,1 случая на 100 тыс. населения).

3. В 2006-2012 гг. в Республике Беларусь наблюдалась тенденция «постарения» сифилиса. Доля подростков 15-17 лет снизилась в 2,3 раза, лиц 18-19 лет – в 1,9 раза, 20-29 лет – в 1,4 раза на фоне роста удельного веса лиц 30 лет и старше, которые составили 62,7%.

4. За период 2006-2012 доля сельских жителей от общего числа больных сифилисом возросла на 4,6% и составила 39,4%.

5. Прошедший период характеризовался уменьшением числа случаев врожденного сифилиса, который с 2011 года не регистрировался. В то же время возросло число больных с нейросифилисом и поздними формами данного заболевания.

6. За анализируемые годы укрепилась тенденция роста активного пути выявления сифилиса медицинскими организациями, что в определенной степени связано с высоким уровнем заболеваемости ранним скрытым сифилисом (52% в 2006 г. и 49% в 2012 г.). Так, если в 2006 г. самостоятельно обратились к врачу 8,3%, то в 2012г. – лишь 5,2%.