

*Павлюченко Д.*

## **НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19**

*Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Никитина Е.В.*

*Кафедра акушерства и гинекологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Проблема невынашивания беременности - одна из самых актуальных в современном акушерстве. Частота неразвивающейся беременности (НБ) имеет тенденцию к увеличению и составляет 16-21%

По данным статистики, из числа диагностированных желанных беременностей каждая пятая завершается самопроизвольным абортom или останавливается в развитии («замирает») примерно в равной пропорции. Большая часть случаев невынашивания и неразвивающихся беременностей (до 80%) приходится на I триместр гестации. Актуальность этой проблемы связана не только с масштабами репродуктивных потерь, но и с неблагоприятным прогнозом, поскольку значительная часть перенесённых ранее эпизодов замершей беременности впоследствии переходит в привычное невынашивание.

**Цель:** оценить течение неразвивающейся беременности на фоне ковид инфекции.

**Материалы и методы.** Проведен ретроспективный анализ 50 историй болезни пациентов с замершей беременностью в период пандемии Covid-19 с 2019 по 2023 год на базе УЗ «БГКРД» г.Минска. Контрольную группу составили пациенты с замершей беременностью без Covid-19. Критериями оценки течения неразвивающейся беременности были: возраст пациентки, паритет родов, сопутствующие экстрагенитальная патология, клинико-лабораторные исследования, гистологические изменения abortированного материала. Возраст пациенток с неразвивающейся беременностью составил от 20 до 38 лет. Результаты обработаны с помощью программы Statistica 10.

**Результаты и их обсуждение.** Нами исследовано течение Ковид-19 у пациенток с неразвивающейся беременностью, методы прерывания беременности у пациенток с неразвивающейся беременностью и Covid-19 и влияние, а также осложнения при прерывании беременности у пациенток с неразвивающейся беременностью и коронавирусной инфекцией. Коронавирусная инфекция у пациенток с неразвивающейся беременностью протекала всегда в легкой форме (100%). Из экстрагенитальной патологии преобладали заболевания мочевыделительной системы -14 %. Также рассматривались вопросы о наличии других инфекционных агентов, как причин развития замершей беременности; влияние сопутствующей экстрагенитальной и гинекологической патологии. Частота возникновения осложнений медикаментозного прерывания составила 6%

**Выводы:** неразвивающаяся беременность является актуальной проблемой в современном мире. Covid-19 может являться одним из этиологических факторов, способствующих развитию неразвивающейся беременности.