

ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Михайлова О.В.

*Белорусский государственный медицинский университет,
Минск, Беларусь*

Цель. Выявить особенности течения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза легких в современных условиях.

Материалы и методы. Проведен ретро- и проспективный анализ 224 карт стационарного лечения пациентов, находившихся в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2013-2023 гг. В исследуемую группу включены пациенты с диагнозом ТБ легких с сопутствующим диагнозом ВИЧ-инфекции.

Результаты и их обсуждение. При анализе патологии выявлено, что мужчины составляли – 73,21% пациентов, женщины – 26,79%. Возраст в 49,1% случаев находился в пределах 30-40 лет. У подавляющего большинства пациентов – 91,51%, преобладала легочная форма ТБ, внелегочная – у 8,49%.

Впервые выявленный ТБ отмечался у 79,01% пациентов, рецидив из 3 группы был у 3,57% пациентов, рецидив у снятых с учета – у 10,27%, прибывшими больными были зафиксированы 2,23% случаев.

Большинство из обследованных пациентов были городские жители – 89,29%. Лицами без определенного места жительства являлись 2,67% пациентов, приезжими из других стран – 2,69%.

Анализ лекарственной чувствительности МБТ к противотуберкулезным лекарственным средствам показал, что возбудитель чувствителен к R в 30,36% случаев, устойчив – 29,02%, к H – 21,86%, устойчив – 25,9%, E – 23,66%, устойчив – 9,82%, Z – 16,52%, устойчив – 9,38%. При анализе бактериовыделения, было выяснено, что КУБ получена в мазке у 64,73% пациентов, культивируется МБТ у 75,45% пациентов.

Исходом терапии в 24,55% случаев стало излечение, неудача с переводом на МЛУ-терапию – в 50,89%. Антиретровирусную терапию принимали 87,5% пациентов, принимали ко-тримоксазол 75,45% пациентов.



IX САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Выводы. При анализе группы пациентов выяснилось, что в случаях ВИЧ-ассоциированного туберкулеза преобладают мужчины, наибольшая частота встречаемости в возрасте от 31 до 40 лет, в большинстве случаев выявляется легочная форма. Больше, чем у половины пациентов, туберкулез был выявлен впервые. Преобладают городские жители, половина пациентов переведена на МЛУ-терапию. Большая часть пациентов принимали антиретровирусную терапию в связи с наличием сопутствующего диагноза ВИ-инфекции.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Региональная общественная организация «СПИД, статистика, здоровье»
Санкт-Петербургская общественная организация
«Человек и его здоровье»
Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинский конгресс»



IX САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

**посвященный 35-летию СПб Центра по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями**

МАТЕРИАЛЫ

Санкт-Петербург
2024