

ПРЕДИКТОРЫ НЕКОНСТРУКТИВНОГО КОМПЛАЕНСА У ЛИЦ, ЗАВИСИМЫХ ОТ АЛКОГОЛЯ, С АГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

А. Д. Сайков, О. А. Скугаревский

*УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь*

Актуальность. Употребление алкоголя часто приводит к эскалации агрессивного поведения у лиц, зависимых от алкоголя, что, в свою очередь, приводит к домашнему насилию и преступлениям [1]. Поэтому так важно использовать персонализированные и комплексные подходы к лечению для повышения эффективности терапии у данной категории пациентов [2].

Цель исследования. Выяснить межгрупповые различия и определить значимость предикторов у лиц с разным типом комплаенса, страдающих алкогольной зависимостью, со склонностью к агрессивному поведению в состоянии интоксикации.

Материал и методы. Выборку составили 134 пациента мужского пола с синдромом зависимости от алкоголя. В основную группу вошли 57 пациентов имевших многократную (подгруппа А, 33 человека) и однократную судимость (подгруппа Б, 24 человека) в связи с агрессивным поведением при интоксикации алкоголем. Группа сравнения состояла из 77 пациентов. В качестве вероятных предикторов комплаентности исследовали социодемографические, клинико-динамические, нейропсихологические и лабораторные данные пациентов. Опираясь на ранее полученные данные [3], конструктивный и условно-конструктивные виды объединили, а каждый из неконструктивных, наоборот, выделили в отдельную группу. Объединение в одну группу пациентов с конструктивным и условно-конструктивными типами комплаентности (формальный, пассивный, симбиотический) посчитали обоснованным ввиду того, что пациентам обеих групп было свойственно понимание болезненного влечения к алкоголю

и в разной степени, но все же стремление к получению медицинской помощи.

Основные результаты. Для условно-конструктивного типа типичными явился адаптивный тип семейных отношений. Ригидный тип семьи оказался характерным для нестабильного и негативистического типов, а хаотичный — для дефицитарного типа комплаенса. Предикторная значимость уровня образования оказалась ниже. В целом пациенты с неконструктивными типами были образованы хуже.

Все пациенты с неконструктивным комплаенсом имели дефицит исполнительской функции, наиболее глубокий у пациентов с дефицитарным типом комплаенса, что существенно отличало их не только от пациентов с условно-конструктивным типом, но и от пациентов с нестабильным и негативистичным комплаенсом.

Судя по результатам Р-300, у лиц с дефицитарным комплаенсом имел место нейрокогнитивный дефицит (кроме проблем с исполнительской функцией), что отличало их и от пациентов с условно-конструктивным и других типов неконструктивного комплаенса.

Выяснилось, что у пациентов с дефицитарным типом комплаенса существенно выше оказался средний показатель АЛТ — 109, 29 МЕ/л, выходящим за пределы значений условной нормы (от 7 до 45 МЕ/л).

Литература:

1. Neurobiology of Aggression—Review of Recent Findings and Relationship with Alcohol and Trauma / M. Fritz, S. M. Soravia, M. Dudeck [et al.]. Mode of access: <https://doi.org/10.3390/biology12030469>. Date of access: 22.08.2024.

2. Hser, Y. I. Methadone maintenance treatment reduces heroin use, HIV risk behavior, and criminality: 3-Year findings from the National Institute on Drug Abuse Clinical Trials Network Protocol 002 / Y. I. Hser, L. J. Mooney, A. J. Saxon // J. of Cons. and Clin. Psychology, 2017. N 85 (10). P. 984–997.

3. Сайков, А. Д. Комплаентность пациентов с алкогольной зависимостью и агрессивным поведением в состоянии интоксика-

ции / А. Д. Сайков, О. А. Скугаревский // Международный научно-практический журнал Психиатрия. Психотерапия и клиническая психология. 2022. № 1. С. 13–17.