

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.

Соболева Ю.А.

*УО «Белорусский государственный медицинский университет»
г. Минск*

Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 203 пациентов в возрасте от 10 до 17 лет с установленным диагнозом «доброкачественное новообразование яичников», находившихся на стационарном лечении в гинекологических отделениях УЗ «1 ГКБ» г. Минска за период 2018-2023 гг с целью изучения частоты встречаемости опухолевидных новообразований яичников у детей и подростков, анализа морфологической структуры образований в зависимости от возраста, а так же определения тактики ведения пациентов с доброкачественными новообразованиями яичников в детском и подростковом возрасте и оценки ее эффективности. Все пациенты были разделены на 2 группы в соответствии с возрастом. Первая группа – 49 пациентов в возрасте 10-13 лет, вторая группа – 154 пациента 14-17 лет.

Средний возраст пациентов I группы составил $12 \pm 0,9$ лет, II группы – $15,5 \pm 1,2$ года. Средний возраст наступления менархе в младшей возрастной группе – $11,3 \pm 1,0$ лет, в старшей группе – $12,3 \pm 1,1$ лет.

В результате анализа жалоб было установлено, что у пациентов 10-13 лет преимущественно возникали боли в нижних отделах живота – 46,9%, 20,4% пациентов жалоб на момент осмотра не предъявляли, 14,3% пациентов отмечали нарушения менструального цикла по типу олиго – и дисменореи. Среди пациентов 14-17 лет боли внизу живота беспокоили 55,8% девушек, у 18,8% пациентов заболевание протекало бессимптомно, в 14,9% случаев наблюдались аналогичные нарушения менструального цикла по типу олиго – и дисменореи.

В ходе анализа данных ультразвукового исследования органов малого таза у пациентов обеих групп установлено, что образования правого яичника диагностировались чаще, чем левого в обеих возрастных группах: 57,1% в I группе и 55,8% случаев во II группе. У 1,3% пациентов образования яичников были билатеральными.

9–11 апреля 2024 года

Научно-практическая конференция с международным участием

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

По результатам морфологического исследования в структуре доброкачественных образований яичников у пациентов 10-13 лет преобладали тератомы – 54,3%, второе по частоте место заняли серозные цистаденомы – 20,0%, гранулёзноклеточные опухоли встречались в 14,2% случаев. У пациентов 14-17 лет среди гистологических типов преобладали фолликулярные кисты – 28,3%, тератомы – 18,9%, серозные цистаденомы – 18,1%. Эндометриоидные кисты встречались только в данной возрастной группе и составили 7,1% случаев.

При выборе тактики ведения пациентов преимущество отдавалось консервативным методам: 63,3% пациентов младшей возрастной группы и 55,2% пациентов старшей возрастной группы. Противовоспалительная терапия НПВС назначалась 25,8% пациентов I группы и 36,5% пациентов II группы. Следует отметить, что в 32,3% и 17,7% случаев в I и II возрастных группах соответственно эффекта от консервативной терапии не было, что в дальнейшем потребовало проведения таким пациентам оперативного вмешательства.

Оперативное лечение выполнено 53,1% пациентам I группы и 54,5% пациентам II группы. Преимущественно выполнялась лапароскопическая цистэктомия – более 95% случаев в обеих группах. Выполнение аднексэктомии или использование лапаротомического доступа было выполнено 1 пациенту I группы и обусловлено осложненным течением опухолевидного процесса (некроз придатков из-за полного перекрута ножки опухоли).

Краткое резюме на русском языке

Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 203 пациентов в возрасте от 10 до 17 лет с установленным диагнозом «доброкачественное новообразование яичников», находившихся на стационарном лечении в гинекологических отделениях УЗ «1 ГКБ» г. Минска за период 2018-2023 гг с целью изучения частоты встречаемости опухолевидных новообразований яичников у детей и подростков, анализа морфологической структуры образований в зависимости от возраста, а так же определения тактики ведения пациентов с доброкачественными новообразованиями яичников в детском и подростковом возрасте и оценки ее эффективности.

Краткое резюме на английском языке

A retrospective research was carried out in the gynecological departments of the 1st City Clinical Hospital (Minsk, Belarus) for the period 2018-2023 and included 203 respondents aged 10 to 17 years old with a diagnosis of "benign ovarian tumor". The aim of the research was to study the prevalence of benign ovarian tumors in children and adolescents, to analyze the morphological structure of formations depending on age, as well as determining the management of such patients.

9–11 апреля
2024 года



IV

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России (Москва, ул. Академика Опарина, 4)

Научно-практическая конференция
с международным участием

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ