

СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ Г. МИНСКА ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Рубан А.П.^{1, 2}, Давидович С.А.³, Завада А.Н.³

¹ ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», Минск, Республика Беларусь

² УО БГМУ, Минск, Республика Беларусь

³ УЗ «4 Городская детская клиническая поликлиника», Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Оценка структуры и распространенности аллергопатологии (АП) по данным обращаемости за амбулаторной медицинской помощью — один из способов контроля ситуации над заболеваемостью детей, проживающих в столице Республики Беларусь (РБ).

Цель исследования. Проанализировать распространенность и структуру АП населения г. Минска в возрасте от 0 до 18 лет, а также соотношение рассчитанных величин с данными отчетов, полученных с применением других методик.

Пациенты и методы. Распространенность и структура АП рассчитаны по итогам работы централизованного кабинета аллергопомощи детям и подросткам на базе УЗ «4 Городская детская клиническая поликлиника» (4 ГДКП) г. Минска в 2023 г. Кабинет обслуживает 9 городских детских поликлиник столицы с общей численностью 155,5 тыс. детского населения — 42,75% детей и подростков г. Минска. Ранее в отчетах детских внештатных аллергологов были представлены показатели распространенности АП у детей РБ: для БА — 10,72‰, АтД — 8,3‰ и АР — 4,64‰.

Результаты. Согласно данным организационно-методического отдела 4 ГДКП, в аллергокабинет в 2023 г. обратились с изолированными аллергическим ринитом (АР, J30) — 2024 пациента (58,3% от всей когорты пациентов), с астмой (БА, J45) — 613 (17,5%), с атопическим дерматитом (АтД, L20) — 535 (15,3%), с крапивницей (L50) — 127 (3,6%), с другими неблагоприятными эффектами, не классифицированными в других рубриках (T78) — 184 (5,3%). Общее количество посещений (коэффициент осмотров) составили для пациентов с АР — 7945 (3,9), с БА — 1426 (2,32), с АтД — 800 (1,5), с крапивницей — 209 (1,6), с T78 — 266 (1,4). Большее количество осмотров у пациентов с АР и БА обусловлено проведением аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Всего за 2023 г. проведено 217 курсов АСИТ (у 6,2% обратившихся пациентов). Распространенность по обращаемости всей АП составила 22,5‰; АР — 13,3‰; БА — 3,9‰; АтД — 3,4‰; крапивницы — 0,8‰; T78 — 1,2‰. Данные величины не совпадают с ранее представленными в отчетах детских внештатных аллергологов страны и регионов: меньше по БА в 2,7 и по АтД — в 2,4 раза, больше по АР в 2,9 раза.

Заключение. Показатели распространенности БА и АтД по данным обращаемости за амбулаторной медицинской помощью у детей г. Минска значительно ниже общемировых и республиканских данных, АР — ниже общемировых данных, что может свидетельствовать о гиподиагностике и требует дополнительного анализа. Повышение показателя распространенности АР относительно республиканских данных отражает активность проведения АСИТ в 4 ГДКП. Для оценки истинной распространенности АП необходим комплексный анализ работы различных служб.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ XXV КОНГРЕССА ПЕДИАТРОВ РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

Москва, 1–3 марта 2024 г.



Уважаемые коллеги, значком «Сюз педиатров России» отмечены тезисы, которые с точки зрения правильности планирования исследования и описания полученных результатов заслуживают внимания каждого педиатра!