ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Семенкович П.А., Лепиков Н.А., Чепелев С.Н.
Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск, Беларусь

Актуальность. Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) – собирательный термин, включающий в себя такие патологии как тромбофлебит поверхностных вен, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии и является частой причиной смерти и инвалидизации населения, существенно увеличивая затраты здравоохранения на лечение данной группы послеоперационных пациентов. Частота тромбоза глубоких вен в общей популяции составляет около 160 случаев на 100 000 человек с частотой фатальной тромбоэмболии легочной артерии 60 на 100 000.

Цель исследования. Оценить вероятность развития ВТЭО у пациентов хирургического отделения центральной районной больницы.

Материалы и методы. В ходе выполнения работы использовались материалы лечения пациентов, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении УЗ «Вилейская ЦРБ» в 2022 году. Для оценки риска ВТЭО использован статистический анализ шкалы Каприни. Анализ полученных данных проведен в MS Excel 2019.

Результаты. В период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года выполнено 98 операций у пациентов с аппендицитом и холециститом. Из них пациентов трудоспособного возраста – 56,1 %, мужчин – 30,6 %; женщин – 69,4 %, средний возраст пациентов составил 51,8 лет. В результате статистического анализа обозначились три группы пациентов. Первую составили пациенты с высоким риском (вероятность развития ВТЭО >1,8 %) – 32 человека. Вторую группу – со средним риском (вероятность развития ВТЭО >0,7 %) – 51 человек. Третью группу – с низким риском (вероятность развития ВТЭО <0,5 %) – 15 человек. Для предотвращения развития указанных осложнений всем пациентам

назначалась специфическая и неспецифическая профилактика ВТЭО. Всем пациентам из статистической выборки выполнялось хирургическое вмешательство. Ни у одного из пациентов в ходе стационарного наблюдения не было выявлено признаков ВТЭО.

Выводы. Таким образом, большинство пациентов в послеоперационный период имело риск развития ВТЭО порядка 0,7 %. 32,6 % пациентов имело высокий риск развития ВТЭО, низкий риск – 14,3 % пациентов. Наиболее часто встречающимися факторами, которые приводили к повышению процента риска являлись: вид хирургического доступа (лапаротомия либо лапароскопия), ИМТ более 25, наличие в анамнезе варикозной болезни вен нижних конечностей.

МИНЗДРАВ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Материалы VII Дальневосточного медицинского молодежного форума

*(Дальневосточный государственный медицинский университет,
г. Хабаровск, 2–14 октября 2023 года)*

Хабаровск
Издательство ДВГМУ
2023