

Закономерности установления инвалидности пациентам со злокачественными новообразованиями молочной железы в зависимости от медико-социальных факторов

Ильюхин П.А.

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
г. Минск, Республика Беларусь

С целью определения закономерностей формирования решений МРЭК об установлении инвалидности по критерию «клинико-трудовой прогноз», нами проведен анализ результатов первичного освидетельствования 233 пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы.

Анализу подверглись такие медико-социальные факторы, как возраст пациента, уровень полученного образования, трудовая занятость, класс условий труда и наличие или отсутствие вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам проведенного исследования социальных факторов, влияющих на оценку клинико-трудового прогноза и установление инвалидности выявлены следующие особенности:

– вторая группа инвалидности чаще устанавливалась пациентам с низким уровнем образования (у пациентов с профессиональным техническим образованием инвалидность второй группы при первичном освидетельствовании устанавливалась в 86,6% случаях, с общим средним и общим базовым – 100,0% случаев, в то время как доля инвалидов второй группы у пациентов, имеющих высшее или среднее специальное образование составила 76,9% и 72,7% соответственно).

Проведенная статистическая обработка полученных результатов подтвердила наличие достоверной связи между низким уровнем полученного образования и более высокой группой инвалидности, установленной по результатам первичного освидетельствования ($r_T=0,122$, $p<0,05$);

– сравнение показателей тяжести первичной инвалидности в различных возрастных группах показал, что инвалидность второй группы значительно чаще устанавливалась пациентам старше 60 лет, по сравнению с пациентами в возрастных группах 45-59 лет и 18-44 лет (в 93,7%, 64,6% и

58,8% случаях соответственно), в то время как именно пациенты в возрастных группах 18-44 лет и 45-59 лет в 11,8% и 8,3% случаях соответственно, по результатам первичного освидетельствования инвалидами не признавались;

– пациентам, занятым в оптимальных (класс 1) и допустимых (класс 2) условиях труда при первичном освидетельствовании устанавливалась более высокая группа инвалидности – первая или вторая ($r_T = -0,234$, $p < 0,01$). Обратная корреляция между тяжестью первичной инвалидности отмечена у освидетельствованных, занятых во вредных условиях (классы 3.1 и 3.2) ($r_T = -0,101$, $p < 0,05$).

Abstract. Medical and social factors such as level of education ($r_T = 0,122$, $p < 0,05$), age, class of working conditions ($r_T = -0,234$, $p < 0,01$) is one of the most important criteria for determining disability in patients with breast cancer.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Тезисы докладов
республиканской научно-практической конференции
с международным участием «Вопросы медицинской
экспертизы и реабилитации»
(Минск, 5–6 сентября 2024 г.)

*Под редакцией заслуженного деятеля науки Республики Беларусь,
доктора медицинских наук, профессора В. Б. Смычка*

Минск
«Колорград»
2024