

Таргетная терапия в лечении пациентов с немелкоклеточным раком легкого

Введение. Рак легкого занимает ведущее место в структуре онкологической заболеваемости. Агрессивность его течения обуславливает высокую смертность. В Республике Беларусь в 2019 г. стандартизованный показатель заболеваемости составил 46,9, смертности – 34,1 на 100 тыс. населения. В настоящее время эти показатели находятся на высоком уровне, и тенденции к их снижению нет.

Цель. Дать оценку эффективности таргетной терапии у пациентов IIIB–IV стадии с НМРЛ на ретроспективном материале.

Материалы и методы. В материал и методы вошли наблюдения за 32 пациентами с НМРЛ за 4-летний период с 01.2018 по 12.2021 гг. включительно. Средний возраст заболевших составил $59,8 \pm 2,1$ лет (мужчин – 14, женщин – 18). IV стадия была установлена у 31 (96,9%) пациентов, IIIB стадия была у 1 пациента. У всех пациентов верифицирована аденокарцинома. Метастатический процесс в виде M1A был установлен у 17 пациентов (53,1%), у 2 (6,3%) пациентов – M1B. В 12 (37,5%) случаях было установлено M1C.

Результаты. При лечении пациентов с IIIB–IV стадией НМРЛ использовали ингибиторы VEGF, ингибиторы EGFR I поколения, ингибиторы ALK I–II поколений. Общая выживаемость пациентов составила $23,18 \pm 2,23$ мес. Выживаемость без прогрессирования составила 11,28 мес. Однолетняя выживаемость – 91%. Трехлетняя – 28%. Пациенты на поддерживающей терапии бевацизумабом в комбинации с полихимиотерапией достигали медианы выживаемости в 20,19 мес. Выживаемость без прогрессирования составила 11,28 мес. Пациенты на терапии ИТК EGFR I поколения достигали медианы выживаемости в 24,92 мес. Выживаемость без прогрессирования составила 10,9 мес. Пациенты на терапии ИТК ALK I–II поколений достигали медианы выживаемости в 60,39 мес. Выживаемость без прогрессирования составила 6,38 мес. Прогрессирование заболевания было установлено в 27 (84%) случаях.

Выводы. Таргетная терапия показывает значительное преимущество в лечении пациентов с НМРЛ IIIB–IV стадии в сравнении со стандартной химиотерапией, что соответствует данным мировой литературы. При определенных факторах препараты таргетированного действия, в частности ИТК ALK могут рассматриваться как индукционная терапия перед хирургическим лечением. Поддерживающая терапия бевацизумабом в комбинации с ПХТ не дает значительных преимуществ в общей выживаемости пациентов, что коррелирует с мировыми данными. При использовании таргетной терапии и в нашем исследовании преодолели одногодичный рубеж выживаемости 91% пациентов.

Международный научно-практический журнал

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2024, том 12, №2, приложение (online)

Eurasian Journal of Oncology

International scientific journal

2024. Volume 12. #2. Supplement (Online)

Тезисы докладов XIV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

XIV Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,
посвященный 30-летию АДИОР СНГ и ЕВРАЗИИ

25–27 апреля 2024. Таджикистан

ONLINE



ISSN 2309-7485 (Print)
ISSN 2414-2360 (Online)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИЗДАНИЯ