

Рак тела матки у женщин репродуктивного возраста в Республике Беларусь

Введение. В развитых странах неуклонно отмечается рост заболеваемости раком тела матки (РТМ), в том числе и среди женщин репродуктивного возраста, у которых возможно применение органосохраняющего лечения. В Республике Беларусь (РБ) показатель заболеваемости РТМ составляет 23,6 на 100 000 женского населения, возрастной пик приходится на период постменопаузы – 55–69 лет. Поскольку ранее доля заболевших РТМ, распределение по стадиям и эффективность стандартного лечения у женщин репродуктивного возраста в РБ не изучались, назрела настоятельная необходимость предварительной оценки среди всех пациенток РТМ числа потенциальных кандидатов для выбора органосохраняющего лечения.

Цель. Установить численность заболевших, распределение по стадиям и эффективность стандартных методов лечения РТМ в РБ среди пациенток репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные Белорусского канцер-регистра. К пациентам раннего репродуктивного возраста относили женщин от 18 до 34 лет, позднего – от 35 до 49 лет. Анализ выполнен с использованием программы Microsoft Office Excel 2021.

Результаты. За изучаемый период (2003–2022 гг.) всего выявлено 37 062 случаев заболевания РТМ. В репродуктивном возрасте (18–49 лет) диагностирована 4591 (12,4%) женщина: в раннем репродуктивном возрасте – 292 (0,79%), в позднем – 4299 (11,6%).

Распределение по стадиям в целом представлено I стадией – в 3602 (78,5%) случаях, II – в 316 (6,9%), III – в 403 (8,8%) и IV – в 150 (3,3%). Доля случаев РТМ, выявленных в I стадии заболевания, среди женщин в возрасте 18–34 года составила 80,5%, в возрасте 35–49 лет – 78,3%, во II – в 8,0% и 9,6% соответственно и в III–IV стадиях – 11,5% и 12,1% соответственно.

Общая 5-летняя выживаемость среди женщин репродуктивного возраста в 2022 году составила $89,8 \pm 1,1\%$, в том числе при I стадии – $96,2 \pm 0,8\%$, II – $81,1 \pm 8,4\%$, III – $73,5 \pm 5,4\%$, IV – $33,9 \pm 7,5\%$. Среди пациенток раннего репродуктивного возраста общая пятилетняя выживаемость составила $96,3 \pm 2,1\%$, позднего – $89,4 \pm 1,2\%$ ($p < 0,05$).

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что среди всех пациентов РТМ в РБ женщины репродуктивного возраста составляют 12,4%, что представляет значимую когорту для планирования органосохраняющего лечения. В подавляющем большинстве случаев заболевание диагностируется в I стадии и характеризуется высокими показателями выживаемости после проведенного стандартного лечения, особенно у пациенток раннего репродуктивного возраста.

Международный научно-практический журнал

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2024, том 12, №2, приложение (online)

Eurasian Journal of Oncology

International scientific journal

2024. Volume 12: #2. Supplement (Online)

Тезисы докладов XIV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

XIV Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,
посвященный 30-летию АДИОР СНГ и ЕВРАЗИИ

25–27 апреля 2024. Таджикистан

ONLINE



ISSN 2309-7485 (Print)
ISSN 2414-2360 (Online)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИЗДАНИЯ