ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

Ивановская К.В., Давыдова Л.А.
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Диагностика и лечение варикозного расширения вен малого таза является в настоящее время очень актуальной темой. По данным литературы отмечается значительный интерес к феномену расширенных вен малого таза у специалистов – гинекологов, урологов, флебологов.

Частота встречаемости указанной патологии колеблется от 6 до 15%. Данная патология традиционно ассоциирована с женским полом, в связи с чем её часто называют варикозной болезнью таза у женщин.

Цель исследования. Провести анализ данных о кровоснабжении органов малого таза. Выявить факторы риска патологии.

Материалы и методы исследования. Материалом для настоящего исследования послужили данные, полученные при исследовании УЗИ с допплерографией органов малого таза 8 пациенток в возрасте от 22 до 52 лет, полученные на базе частного медицинского центра “Ф–клиник”.

Результаты исследования. Варикозная болезнь таза (ВБТ) — заболевание, характеризующееся расширением яичниковых вен и внутритазовых венозных сплетений, многократно соединяющихся между собой: гроздевидное сплетение яичника, маточно–влагалищное, мочепузырное, пресакральное и прямокишечное сплетения. Сплетения соединяются между собой и отводят венозную кровь от соответствующих органов. Кровь из гроздевидного сплетения оттекает в яичниковые вены, а из других сплетений — во внутренние подвздошные вены, откуда через общие подвздошные вены кровь попадает в нижнюю полую вену [1].

К внутритазовым венозным сплетениям относят совокупность вен различного калибра, окутывающих определённые органы и многократно соединяющихся между собой.

В литературе описаны анатомические предпосылки развития варикозной болезни вен малого таза. Это в первую очередь прямохождение человека, и сложившееся в связи с этим строение системы вен таза в виде сплетения [2].

Варикозная болезнь вен малого таза впервые описана в 1949 г. H. Taylor, который отметил связь между нарушением венозного кровотока в матке и возникновением синдрома хронических тазовых болей у женщин [3].

Причины заболевания. Варикозная болезнь таза связана с хроническим застоем венозной крови в малом тазу. Условия для возникновения этого процесса возникают на фоне различных провоцирующих факторов, протекающих с течением жизни женщины.

В настоящее время установлено, что развитие и степень варикозного расширения вен малого таза зависят от следующих факторов риска: возраст, количество беременностей и родов, условия труда, гиподинамия, наследственная предрасположенность, избыточная масса тела; различные гинекологические патологии и др.

В результате исследования снимков УЗИ было обнаружено, что чаще всего ВРВ ОМТ встречается у рожавших женщин, принимающих гормональные препараты в течение длительного времени, а также после экстракорпорального оплодотворения. Во всех случаях синдром тазовых болей был обусловлен расширением яичниковых вен.

Заключение: Варикозная болезнь таза (ВБТ) – заболевание, характеризующееся расширением яичниковых вен и внутритазовых венозных сплетений. Более распространенное поражение вен у женщин можно объяснить влиянием нестабильного гормонального фона, обусловленного месячным циклом, а в ряде случаев – применением гормональных препаратов.

Варикозное расширение вен малого таза сложное заболевание для постановки диагноза и лечения. Поэтому практическим врачам необходимы четкие знания о нормальной анатомии венозной системы тазовых органов, а также этиологии, патогенеза, диагностики и методов лечения варикозного расширения вен малого таза.

Список литературы

1. Ilyina I.Yu., Dobrokhotova Yu.E., Titchenko I.P., Grudkin A.A. Varicose veins of the pelvis in women as one of the manifestations of connective tissue dysplasia // Russian bulletin of the obstetrician–gynecologist. – 2009. – V. 9. – №. 2. – P. 39–42. Russian (Ильина И.Ю., Доброхотова Ю.Э., Титченко И.П., Грудкин А.А Варикозное расширение вен малого таза у женщин как одно из проявлений дисплазии соединительной ткани // Российский вестник акушера–гинеколога. – 2009. – Т. 9. – №. 2. – С. 39–42.)

2. Gavrilov S.G., Butenko O.I., Cherkashin M.A. Varicose veins of the pelvis: the current state of the problem // Annals of Surgery. – 2003. – №. 1. – P. 7–12. Russian (Гаврилов С.Г., Бутенко О.И., Черкашин М.А. Варикозная болезнь вен малого таза: современное состояние проблемы // Анналы хирургии. – 2003. – №. 1. – С. 7–12.)

3. Taylor H.C. Vascular congestion and hyperemia; their effect on function and structure in the female reproductive organs; etiology and therapy // American journal of obstetrics and gynecology. – 1949. – V. 57. – №. 4. – P. 654–668.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Общество молодых учёных и студентов СГМУ им. В.И. Разумовского

YOUNG PEOPLE AND SCIENCE: RESULTS AND PERSPECTIVES

Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции
студентов и молодых учёных с международным участием

Саратов, 6-8 декабря 2023 года

Саратов
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
2023