

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

Метельский С.М.¹, Горбарчук А.А.², Кетрис А.С.², Ермолкевич Р.Ф.³, Федоров С.Е.³,
Кецко В.А.³, Шпак П.А.³, Саченко В.В.³, Ярошовец В.В.³

¹Военно-медицинский институт в учреждении образования «Белорусский
государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

²ГУ «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
Минск, Беларусь

³ГУ «432 Главный военный клинический медицинский центр ВС РБ», Минск, Беларусь

metelskiysm@yandex.ru

Медицинское освидетельствование играет важную роль в решении вопроса комплектования Вооруженных Сил (ВС).

С начала 2023 года в Республике Беларусь (РБ) действуют нормативные документы, позволяющие в ряде случаев при легкой бронхиальной астме (БА) признавать годными к военной службе призывников и военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Цель исследования: анализ структуры увольняемости военнослужащих срочной службы с БА, призванных в 2023г. и в весенний призыв 2024г.

Материалы и методы. Проанализированы все случаи увольнения из рядов ВС РБ по причине БА военнослужащих мужского пола, проходящих службу по призыву. Основанием для увольнения стало персистирующее течение заболевания, потребовавшее назначения симптоматической и базисной терапии. Диагноз БА установлен в соответствии с критериями GINA и национального клинического протокола. Возраст обследованных пациентов – от 18 до 26 лет ($20,5 \pm 0,4$ года).

Результаты. Согласно отчетам военных комиссариатов за 1,5 года (3 последовательных призыва) годными к военной службе с незначительными ограничениями оказались 130 призывников с БА. За отчетный период по состоянию на 01.09.2024 из рядов ВС РБ уволены по болезни в связи с БА 30 военнослужащих срочной службы. Из всех уволенных по болезни 17 пациентам (56,7%) диагноз астмы был впервые выставлен в период военной службы. В 13 случаях (43,3%) пациенты были призваны в ВС РБ с установленным еще до призыва диагнозом БА. У последней когорты военнослужащих астма в течение 5 лет перед призывом не имела клинических проявлений, была контролируемой, с легким интермиттирующим течением, базисная и симптоматическая терапия пациентам не проводилась. Из всех признанных годными в период проведения призывной кампании лиц молодого возраста с БА за проанализированный календарных период увольняемость по болезни составила лишь 10%. Анамнез (время от момента установления диагноза до освидетельствования) у 13 уволенных военнослужащих с верифицированной до призыва БА составил от 6 до 21 года ($14,8 \pm 1,0$).

Выводы. Согласно полученным предварительным данным, из общего числа призванных с астмой в ВС РБ военнослужащих с легкой интермиттирующей астмой в подавляющем большинстве (90%) заболевание не препятствовало прохождению службы по призыву. Вместе с тем, все военнослужащие с БА подлежат обязательному диспансерному наблюдению.

Литература

1. Постановление МЗ от 30.04.2024 №84 Об утверждении клинического протокола «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с бронхиальной астмой».
2. Постановление МО РБ и МЗ РБ от 3 января 2020 г. № 1/1 «Об утверждении Инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью» (в редакции Постановления МО РБ и МЗ РБ от 18.01.2023 № 1/10)



Институт биофизики
и клеточной инженерии
НАН Беларуси



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ БИОФИЗИКИ И КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
НАН БЕЛАРУСИ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ

**Тезисы докладов
IV Международной научной конференции**

Республика Беларусь, Минск, 21–22 ноября 2024 г.

Научное электронное издание

Минск
«Колорград»
2024