

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ АДЕКВАТНОЙ ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПО СУРРОГАТНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВРОЖДЕННЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ

Мохорт Елена Геннадьевна, al_mokhort@mail.ru

Место работы: УО БГМУ

Соавторы: Мохорт Т.В., Коломиец Н.Д., Мохорт Е.Г., Федоренко Е.В., Петренко С.В.

Источник финансирования: нет

Город проживания: Минск, Республика Беларусь

Республика Беларусь относится к странам с адекватной йодной обеспеченностью, что позволило снизить заболеваемость заболеваниями, щитовидной железы, обусловленными дефицитом йода. Поскольку диагностика йоддефицитных тиреоидных заболеваний связана с широким внедрением сонографических и лабораторных исследований без четкого использования диагностических критериев узлового зоба, аутоиммунного тиреоидита и гипотиреоза (включающего манифестный и субклинический), нами в качестве суррогатного показателя адекватности йодной обеспеченности выбрана первичная заболеваемость врожденным гипотиреозом.

Цель. Оценить динамику первичной заболеваемости врожденным гипотиреозом в условиях ликвидации йодной недостаточности в Республике Беларусь.

Материалы и методы: На основании официальных статистических данных за 2007–2023 гг. изучен верифицированный после выявления врожденной тиреоидной дисфункции по результатам тотального скрининга показатель первичной заболеваемости врожденным гипотиреозом (отношение абсолютного числа случаев впервые выявленного заболевания к численности населения, умноженное на 100 000 человек).

Результаты: В течение периода с 2007г. максимальный показатель первичной заболеваемости был зарегистрирован в 2010г. и составил 1,83 на 100.000 населения, а минимальный – в 2021г. (0,65 на 100.000 населения). По итогам 2023г. первичная заболеваемость первичным врожденным гипотиреозом составила 0,99 на 100.000 населения. При этом во всех регионах Республики Беларусь колебания отмечаются в небольшом диапазоне (от 0,51 до 1,45 на 100.000 населения). Приведенные показатели свидетельствуют о спорадическом генезе врожденного гипотиреоза. Несмотря на то, что в последнем исследовании у 700 беременных медиана экскреции йода с мочой составила 121,2 мкг/л, что не соответствует целевой уровню, определенному для беременных, уровень первичной заболеваемости врожденным гипотиреозом остается стабильным, что свидетельствует о стабильности йодного статуса в Республике Беларусь.



ISSN 2410- 5155 (Online), ISSN 2311- 4495 (Print)

Трансляционная Медицина Translational Medicine

Научно-практический рецензируемый медицинский журнал

Приложение № 1

ТЕЗИСЫ

«ИННОВАЦИИ
В ЭНДОКРИНОЛОГИИ-2024»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

25–27 апреля 2024 года
Санкт-Петербург

