

Сушинский В.Э.
**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА**

Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск

Дислипидемия рассматривается как один из наиболее важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Повышение риска смерти от атеросклеротических ССЗ, и прежде всего от ИБС тесно связано с высоким уровнем холестерина и его фракций. При этом среди показателей, характеризующих липидный обмен особое внимание уделяют уровню холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП). Показатели липидного спектра, позволяющие в наибольшей степени снижать риск развития ССЗ определены как целевые показатели. Целевые уровни ХС ЛПНП и другие показатели значительно различаются в зависимости от риска развития осложнений ССЗ. Однако во всех группах только достижение целевых цифр ХС ЛПНП позволяет получить оптимальный результат, значительно снизить риск осложнений. С учетом наличия корреляции между снижением уровня ХС ЛПНП и частоты сердечно-сосудистых осложнений концепция гиполипидемической терапии не редко сегодня представляется как - «чем ниже уровень ХС ЛПНП, тем лучше». В тоже время ряд исследований указывают на невысокую частоту достижения целевого уровня ХС ЛПНП у пациентов в клинической практике, особенно у пациентов высокого и очень высокого риска осложнений.

Цель работы: по результатам анкетирования врачей определить уровень знаний врачей о целевых уровнях ХС ЛПНП, установить основные причины недостижения целевых показателей ХС ЛПНП у пациентов с дислипидемией.

Материал и методы: проведено on-line анкетирование 839 врачей, из которых 548 (65,3%) составили врачи общей практики (ВОП), 145 (17,3%) врачи-терапевты, 57 (6,8%) врачи-кардиологи. Средний возраст врачей специалистов, участвующих в исследовании составил $39,34 \pm 0,21$ лет.

Результаты и обсуждение: при анализе результатов анкетирования установлено, что практически все врачи (98,6%) считают дислипидемию актуальной проблемой клинической практики, определяющей прогноз. При этом только 67,7% правильно указали актуальный в настоящее время целевой уровень ХС ЛПНП у пациентов очень высокого риска осложнений – менее 1,4 ммоль/л. Целевой уровень ХС ЛПНП у пациентов очень высокого риска осложнений – менее 1,8 ммоль/л указало 14,5% врачей; менее 2,5 ммоль/л указало 4,2% врачей; Уровень ХС ЛПНП менее 1,0 ммоль/л рекомендуемый в настоящее время как целевой у пациентов экстремального риска указало 13,6% анкетированных врачей.

Сердечно-сосудистые заболевания принято относить к возрастассоциированной патологии. С возрастом частота дислипидемии увеличивается и знания о проблеме

дислипидемий у пациентов старших возрастных групп имеют первостепенное значение. По результатам анкетирования целевым уровнем ХС ЛПНП у пациентов пожилого и старческого возраста очень высокого риска осложнений менее 1,4 ммоль/л указали 51,7% анкетированных врачей.

По данным исследования 76,9% опрошенных врачей сразу назначают статины у пациентов с дислипидемией и артериальной гипертензией. Среди важнейших причин, сдерживающих от назначения статинов врачи указали: 13,5% – «возможные нежелательные реакции», «увеличение количества таблеток, которые пациент будет принимать» – 10,8%; «увеличение стоимости схемы терапии» – 7,9%; «нагрузка на печень» – 6,4%. Другие, в целом традиционные «мифы» статинотерапии представлены менее 3% ответов, однако они отличались большим разнообразием. В ответах на вопрос что сдерживает от назначения статинов указывались следующие причины для неназначения статинов – «сильные разногласия научных данных», «отдаленные последствия терапии», «необходимость установления перед назначением атеросклероза брахиоцефальных артерий, беременности», «молодой возраст», «низкая переносимость статинов», «повышение ферментов», «негативное отношение пациентов к терапии», «неготовность пациентов принимать их постоянно», «необходимость начинать с диеты» и другие.

По результатам анкетирования установлено, что важнейшими причинами недостижения целевых уровней ХС ЛПНП по мнению врачей являются (допускалось несколько вариантов ответа): 79,3% – низкая приверженность пациентов к лечению гиперхолестеринемии, 79% – несоблюдение пациентами рекомендаций по изменению образа жизни, 70,6% – мифы о вредности и опасности терапии статинами, 42% – редкое назначение врачами комбинированной терапии (эзетимиб со статином), 36,8% – использование минимальных доз статинов (например, розувастатин 5 мг), 34,1% – редкое использование максимальных доз статинов (например, розувастатин 40 мг), 25,3% – врачебная инертность, 23,7% – предпочтительное использованием пациентами БАДов, 11% – плохая переносимость статинов в высоких дозах.

При недостижении целевого ХС ЛПНП 53,6% врачей добавляют эзетимиб к статину, 34,3% врачей – увеличивают дозировку статина до максимальной суточной, 6% – предлагают принимать ω -3 полиненасыщенные жирные кислоты, 2,6% – переводят пациента на эзетимиб.

Большой интерес могут представлять результаты, отражающие представления об «особых» принципах лечения пациентов старших возрастных групп. Так 86,5% врачей считают, что статины у лиц старших возрастных групп увеличивают продолжительность

жизни. При этом считают, что у лиц с ИБС пожилого возраста должны назначаться статины – 96,9% врачей, а у лиц с ИБС старческого возраста только 76,2%.

Заключение и выводы: отмечено недостаточные знания врачей о целевых уровнях показателей, характеризующих липидный обмен – ХС ЛПНП. По мнению врачей причины недостижения целевых уровней ХС ЛПНП связаны с моделью поведения пациентов. Выявлены многочисленные факторы, определяющие недостижение целевых показателей ХС ЛПНП в клинической практике. Наиболее современную стратегию – назначение комбинированной терапии статинов с эзатимибом - предпочитают лишь немногим более половины врачей. Достижение целевых показателей ХС ЛПНП является ключевым фактором снижения риска осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Материалы

IV Евразийского конгресса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний,
посвященный к 450-летию г.Уфа
29-30 ноября 2024г.



Уфа 2024