

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКУ И ПРОФИЛАКТИКУ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИЕЙ MODERN VIEW ON SCREENING DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

Вербичская М.С.¹, Савицкая В.М.¹, Новикова Н.И.²
Verbitskaya M.S.¹, Savickaya V.M.¹, Novikova N.I.²

1 – Белорусский государственный медицинский университет
2 – «Медицинский центр МТЗ» г. Минск

1 – Belarusian State Medical University
2 – "Medical Center MTZ" Minsk

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день мировыми научными исследованиями определена связь между выявлением вируса папилломы человека (ВПЧ) и развитием рака шейки матки (РШМ). Следует отметить, что в последние годы в мире отмечается рост заболеваемости РШМ у женщин молодого возраста. За последние 50 лет у женщин в возрасте 25–29 лет произошло увеличение заболеваемости РШМ в 5,1 раз.

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность проведения амбулаторного скрининга ВПЧ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проводилось ретроспективное исследование 70 медицинских карт стационарных пациентов гинекологических отделений г. Минска, у которых был установлен диагноз цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) шейки матки, а также изучалась частота проведения амбулаторного скрининга диагностики и профилактики ВПЧ, далее оценивались результаты. Изучалась степень иммунизации вакцинами «Гардасил» и «Церварикс». Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакетов программ «Microsoft Excel».

Основная часть. Одним из основных регламентирующих документов Республики Беларусь является приказ № 1505 от 31.11.2021 г. с инструкцией Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О порядке проведения скрининга рака шейки матки» (Приказ). Согласно Приказа популяционный скрининг РШМ проводится женщинам в возрасте от 30 до 60 лет, проводится определение ВПЧ (ВПЧ-тест) с помощью ПЦР 1 раз в 5 лет. ВПЧ-тестирование проводится женщинам, которым в текущем году на момент тестирования исполнилось 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 лет. В следующем году для проведения ВПЧ-тестирования приглашаются женщины, которым в год тестирования исполнилось 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 лет. При положительном ВПЧ-тесте женщине проводится расширенная кольпоскопия с прицельной биопсией шейки матки. Доступность тестирования на вирус папилломы человека делает скрининг на рак шейки матки, который занимает 4 место

в структуре онкологических заболеваний среди женщин трудоспособного возраста в Республике Беларусь, более эффективным.

Женщины фертильного возраста с цервикальной интраэпителиальной неоплазией в исследуемых группах составили 75%. Среди пациентов с цервикальной интраэпителиальной неоплазией чаще выявлялась дисплазия умеренной (54,3%) и тяжелой степени (30%)

Процент молодых женщин, заболевших РШМ, в Республике Беларусь составляет 33,5%, при этом I стадия диагностируется лишь в 40,6% случаев, карцинома II–IV стадий – в 59,4%.

Выводы:

1. Обследование на носительство ВПЧ амбулаторно проходит только одна из четырех женщин с дисплазией шейки матки (24,3%) при этом выявлена прямая статистически значимая связь между ВПЧ диагностикой и степенью тяжести дисплазии шейки матки (уровень значимости $p < 0.05$)
2. Профилактика ВПЧ вакцинами Гардасил-4 и Церварикс среди пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией в исследуемых группах составила 4,3%, причем у всех вакцинированных женщин выявлена легкая степень заболевания, что говорит о необходимости проведения санитарно-просветительской работы и дальнейшей вакцинации населения
3. Наличие хламидиоза и других инфекций, передающихся половым путем, усугубляет течение цервикальной интраэпителиальной неоплазии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме: Статья посвящена актуальной проблеме – профилактике рака шейки матки. В современной гинекологии актуальным является проведение скрининга диагностики и профилактики ВПЧ, оценка результатов исследования и дальнейшее углубленное обследование женщин, что отражено в данном исследовании.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Abstract: The article is devoted to a pressing issue – prevention of cervical cancer. In modern gynecology, it is important to conduct screening diagnostics and prevention of HPV, evaluate the results of the study and further in-depth examination of women, which is reflected in this study.

ПОКАЗАТЕЛИ ТРОМБОЦИТОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОЗДНЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ

PLATELET COUNTS IN PREDICTING LATE PREECLAMPSIA

Виктор С.А., Курлович И.В., Ващилина Т.П.
Victor S.A., Kurlovich I.V., Vashchilina T.P.

Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»

State Institution "Republican Scientific and Practical Center "Mother and Child", Minsk, Republic of Belarus

Преэклампсия (ПЭ) – тяжелое осложнение беременности, которое является одной из главных причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире. Поиск воспроизводимых маркеров ПЭ остается актуальной задачей современного акушерства.



Москва, 21–24 января, 2025

Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ)
Общество по репродуктивной медицине и хирургии (ОРМХ)
Российская ассоциация эндометриоза (РАЭ)
Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

Moscow, January 21–24, 2025

The Ministry of Health of Russia
National Medical Research Center
for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
named after Academician V.I. Kulakov
of the Ministry of Health of Russia
Russian Society of Obstetricians and Gynecologists
Society of Reproductive Medicine and Surgery
Russian Association of Endometriosis
Congress operator MEDI Expo LLC

XIX Международный конгресс ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

XIX International Congress
ON REPRODUCTIVE MEDICINE

МАТЕРИАЛЫ