

Ю.М. Кускова

**ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ
СЕРТРАЛИНА – АНТИДЕПРЕССАНТА КЛАССА СЕЛЕКТИВНЫХ
ИНГИБИТОРОВ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА**

*Научный руководитель: канд. мед. наук, проф. О.Н. Ринейская**Кафедра биоорганической химии**Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск**Y.M. Kuskova*

**WAYS OF OVERCOMING HEPATOTOXICITY OF SERTRALINE,
SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR**

*Tutor: PhD, associate professor O.N. Ryneiskaya**Department of Bioorganic Chemistry**Belarusian State Medical University, Minsk*

Резюме. Терапевтическое действие антидепрессанта Сертралина преимущественно обусловлено способностью ингибировать серотониновый транспортёр SLC6A4. Важную роль в гепатотоксическом действии этого препарата играет ингибирование топоизомеразы II α . В данной работе проведен молекулярный докинг сертралина и его производных с обоими белками. Выявлено несколько высокоаффинных по отношению к SLC6A4 соединений, сравнимых по сродству к топоизомеразе II α с Сертралином.

Ключевые слова: сертралин, гепатотоксичность, серотониновый транспортёр, топоизомераза, AutoDock.

Resume. The therapeutic effect of the antidepressant Sertraline is primarily due to its ability to inhibit the serotonin transporter SLC6A4. Inhibition of topoisomerase II α plays an important role in the hepatotoxic effect of this drug. In this work, molecular docking of sertraline and its derivatives with both proteins was performed. Several compounds with high affinity to SLC6A4 and similar affinity to topoisomerase II α in comparison with Sertraline, were identified.

Keywords: sertraline, hepatotoxicity, serotonin transporter, topoisomerase, AutoDock.

Актуальность. Сертралин – один из самых часто назначаемых и эффективных антидепрессантов нового поколения. Относится к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Терапевтическое действие сертралина преимущественно обусловлено способностью ингибировать серотониновый транспортёр SLC6A4, однако он также ингибирует транспорт натрия, обратный захват норэпинефрина и дофамина и глутаматный цикл в нейронах [1].

Сертралин является одним из представителей класса СИОЗС с наиболее выраженным негативным влиянием на печень [2]. Это связано с ингибированием топоизомераз I и II α , из-за чего возникают повреждения ДНК, препятствующие прохождению контрольной точки G2/M. В большей степени ингибируется топоизомераза II α . Метаболиты сертралина, вероятно, не токсичны [3]. Свой вклад в гепатотоксичность вносит также нарушение работы митохондрий. Сертралин вызывает недостаток АТФ, изменяя проницаемость их внутренней мембраны. Механизм, по-видимому, заключается во взаимодействии с транслокатором адениновых нуклеотидов. Сертралин также ингибирует митохондриальные комплексы I и V цепи переноса электронов [4].

Цель: моделирование и анализ *in silico* взаимодействия сертралина с транспортёром серотонина SLC6A4 и топоизомеразой II α .

Задачи:

1. Описать взаимодействие сертралина с SLC6A4 в установленном при помощи рентгеноструктурного анализа комплексе.
2. Провести молекулярный докинг с топоизомеразой II α и описать активный центр этого белка.
3. Сравнить активные центры серотонинового транспортёра SLC6A4 и топоизомеразы II α .
4. Провести молекулярный докинг для производных сертралина с целью обнаружения потенциально менее токсичных образцов.

Материал и методы. Информация о трехмерной структуре транспортёра серотонина SLC6A4 и топоизомеразы II α получена из свободной базы данных Protein Data Bank [5, 6]. Перед использованием были удалены небелковые молекулы и молекулы воды, цепи белков, не участвующие в связывании лиганда. Дизайн производных сертралина выполнен с помощью программного пакета ChemOffice 16.0 путем замены некоторых групп или добавления к исходной молекуле сертралина различных функциональных групп. С помощью ChemDraw и Chem3D были созданы структурные формулы производных сертралина в 2D и 3D вариантах соответственно. Для молекулярного докинга и визуализации полученных комплексов использовалась программа AutoDockTools 1.5.7 [7], OpenBabelGUI в качестве конвертера форматов файлов. Для визуализации и более детального анализа полученных белок-лигандных комплексов была использована программа PyMOL 2.5.4, онлайн-сервисы PLIP и Protein-Plus. Расчет E_b в системе белок-лиганд производился посредством AutoDockTools. Для анализа использовался генетический алгоритм Ламарка с числом прогонов 50 и размером популяции 300. Для анализа полученных результатов использовались два основных критерия, характеризующих взаимодействия белка и лиганда: E_b - величина свободной энергии Гиббса, и K_i - константа ингибирования.

Результаты и их обсуждение. Был проведён молекулярный докинг для сертралина и найден наиболее энергетически выгодный комплекс с серотониновым транспортёром SLC6A4. Значение E_b для данного комплекса составило -9,93 ккал/моль, K_i - 52,52 нМ.




Рис. 1 – Взаимодействие сертралина с активным центром SLC6A4

Молекула сертралина образует комплекс с серотониновым транспортёром за счёт перпендикулярного π -стэкинга между хлорзамещённым ароматическим кольцом лиганда и фенильным радикалом Tyr-176, водородной связи между аминогруппой и Phe-335, взаимодействия протонированной аминогруппы и фенильного заместителя Tyr-95 и гидрофобных взаимодействий.

В результате докинга сертралина с топоизомеразой $\Pi\alpha$ для наиболее стабильного комплекса получено значение E_b равное -8,82 ккал/моль и K_i - 341,5 нМ.




Рис. 2 – Взаимодействие сертралина с активным центром топоизомеразы $\Pi\alpha$

Связывание с топоизомеразой $\Pi\alpha$, по-видимому, обусловлено перпендикулярным π -стэкингом между ароматическим фрагментом тетрагидронафталина лиганда и индольной группой Trp-62, водородной связью между аминогруппой сертралина и гидроксильной группой Tyr-72 и гидрофобными взаимодействиями с Ser-320 и Ile-311.

Ингибирование обоих ферментов происходит за счёт взаимодействия одних и тех же фрагментов молекулы Сертралина с аминокислотными остатками активных центров белков. Основное отличие заключается в том, что в перпендикулярном π -стэкинге принимают участие разные ароматические кольца.

С помощью программного пакета ChemOffice созданы 12 модификаций сертралина. Для каждой из них получены значения энергии связывания E_b и константа ингибирования K_i .

Табл. 1. Показатели сродства производных Сертралина к транспортёру серотонина SLC6A4 и топоизомеразе $\Pi\alpha$.

	E_b комплекса с SLC6A4, ккал/моль	E_b комплекса с топоизомеразой $\Pi\alpha$, ккал/моль	K_i комплекса с SLC6A4, нМ	K_i комплекса с топоизомеразой $\Pi\alpha$, нМ
Сертралин	-9,93	-8,82	52,52	341,5
Модификация 1	-10,62	-9,67	16,41	81,86
Модификация 2	-10,56	-9,12	18,21	207,67
Модификация 3	-10,59	-9,66	17,39	83,48
Модификация 4	-10,58	-9,76	17,68	70,52
Модификация 5	-11,42	-10,37	4,29	25,24
Модификация 6	-10,89	-9,85	10,42	59,77
Модификация 7	-10,70	-9,69	14,37	79,36
Модификация 8	-13,21	-10,76	207,38	13,03
Модификация 9	-10,92	-10,05	9,88	42,94
Модификация 10	-10,59	-9,64	17,30	86,26

Продолжение таблицы 1

Модификация 11	-14,36	-11,89	0,03	1,93
Модификация 12	-13,37	-10,93	0,16	9,79




Рис. 3 – Производные Сертралина

Структуры, обладающей большим по сравнению с Сертралином сродством к серотониновому транспортеру SLC6A4 и меньшим – к топоизомеразе II α , не было обнаружено. Четыре из предложенных вариантов обладают сравнимыми с исходной молекулой свойствами: вторая, восьмая, одиннадцатая и двенадцатая.

Однако следует отметить структуры-лидеры по энергии связывания с серотониновым транспортером SLC6A4: модификации 5, 8, 11, 12. Особое внимание привлекают соединения № 12 ((1S,4S)-4-(3,4-дихлорфенил)-N-гексил-N-метил-1,2,3,4-тетрагидронафталин-1-амин) и № 11 (N-((1S,4S)-4-(3,4-дихлорфенил)-1,2,3,4-тетрагидронафталин-1-ил)-N-метилнафталин-2-амин), для которых произошло уменьшение энергии связывания с серотониновым транспортером по сравнению с Сертралином на 26% и 31% соответственно, а с топоизомеразой II α – на 26% и 20%.

Выводы:

1. Связывание молекулы сертралина SLC6A4 обусловлено перпендикулярным

π -стэкингом с участием хлорзамещённого бензольного кольца, гидрофобных взаимодействий и образования водородной связи.

2. Активный центр топоизомеразы II α образован аминокислотами Trp-62, Tyr-72, Ser-320 и Ile-311; комплекс образуется за счёт перпендикулярного π -стэкинга, гидрофобных взаимодействий и образования водородной связи.

3. Основное различие в механизмах связывания сертралина выбранными ферментами – участие разных ароматических фрагментов в π -стэкинге.

4. Перспективными для дальнейших исследований являются отличающиеся большей гидрофобностью структуры №11, №12.

Литература

1. Huddart R. et al. PharmGKB summary: sertraline pathway, pharmacokinetics //Pharmacogenetics and genomics. – 2020. – Т. 30. – №. 2. – С. 26-33.
2. Todorović Vukotić N. et al. Antidepressants-and antipsychotics-induced hepatotoxicity //Archives of Toxicology. – 2021. – Т. 95. – С. 767-789. Chen S. et al. The role of hepatic cytochrome P450s in the cytotoxicity of sertraline //Archives of toxicology. – 2020. – Т. 94. – С. 2401-2411.
3. Li Y. et al. Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent //Toxicological Sciences. – 2012. – Т. 127. – №. 2. – С. 582-591.
4. Coleman J. A., Gouaux E. Structural basis for recognition of diverse antidepressants by the human serotonin transporter //Nature structural & molecular biology. – 2018. – Т. 25. – №. 2. – С. 170-175.
5. Stanger F. V., Dehio C., Schirmer T. Structure of the N-terminal Gyrase B fragment in complex with ADP· Pi reveals rigid-body motion induced by ATP hydrolysis //PloS one. – 2014. – Т. 9. – №. 9. – С. e107289.
6. Morris G. M. et al. AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated docking with selective receptor flexibility //Journal of computational chemistry. – 2009. – Т. 30. – №. 16. – С. 2785-2791.