

Анисова А.А., Аль-Шинджиль З.М.Х.,
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОСТПЛОМБИРОВОЧНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КАТЕГОРИИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Научные руководители: д-р. мед. наук, проф. Бутвиловский А.В.,

канд. мед. наук, доц. Полянская Л.Н.

Кафедра эндодонтии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Постпломбировочная чувствительность зубов является одной из наиболее распространенных жалоб пациентов после проведения терапевтического лечения. Несмотря на развитие современных материалов и технологий, случаи постпломбировочной чувствительности продолжают встречаться в клинической практике и могут вызывать значительный дискомфорт у пациентов, снижая качество жизни и уровень доверия к врачу-стоматологу. По данным литературы частота постоперативной чувствительности варьирует от 5 до 30%. В условиях постоянно растущих требований к качеству стоматологической помощи, данная проблема приобретает особую значимость. Именно поэтому изучение данной темы актуально для повышения качества оказания терапевтической стоматологической помощи и оптимизации клинических подходов в повседневной практике.

Цель: определить частоту встречаемости постпломбировочной чувствительности зубов в зависимости от квалификационной категории врача, проводившего лечение.

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 365 практикующих врачей-стоматологов, работающих в частных и государственных структурах здравоохранения Республики Беларусь.

Для сбора данных использовался структурированный анкетный опросник, включающий вопросы о стаже работы, квалификационной категории, применяемых методах лечения, используемых материалах и частоте случаев постпломбировочной чувствительности. Все респонденты были разделены на две группы: в группу 1 включены 145 респондентов без категории или со второй категорией, в группу 2 – 220 респондентов с первой или высшей категорией.

Данные были систематизированы в таблице Microsoft Excel и проанализированы с использованием методов описательной статистики и критерия χ^2 для определения статистической значимости различий между группами.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что большинство респондентов (95,9%) сталкиваются в своей практике с проблемой постоперативной чувствительности зубов. Установлено, что среди респондентов стаж работы менее 5 лет имеют 75 человек (20,5%), от 5 до 10 лет – 54 (14,8%), 11-15 лет – 59 (16,2%) и более 15 лет – 177 человек (48,5%). Из первой группы 2,76% респондентов не встречают в практике постпломбировочную чувствительность, 65,52% респондентов встречают очень редко, 28,97% респондентов – редко, 2,76% респондентов – достаточно часто. Из второй группы 5% респондентов не встречают в практике постпломбировочную чувствительность, 60,91% респондентов встречают очень редко, 28,18% респондентов – редко, 5,91% респондентов – достаточно часто. При сравнении частоты встречаемости постоперативной чувствительности в сформированных группах статистически значимых отличий не обнаружено ($\chi^2 = 3.23$, $P > 0.05$).

Выводы. Большинство респондентов (95,9%) сталкиваются в своей практике с проблемой постоперативной чувствительности зубов. В сформированных группах частота встречаемости постпломбировочной чувствительности зубов не зависела от квалификационной категории врача-стоматолога.