

Сулим Л.А.**РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ АУТОИММУННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА).
РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ.****Научный руководитель: канд.мед.наук, доц. Мохорт Е.Г.***Кафедра эндокринологии**Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Болезнь Грейвса представляет собой достаточно распространенную аутоиммунную патологию, поражающую щитовидную железу. В свое время рак щитовидной железы у пациентов с тиреотоксикозом считался крайне редким заболеванием, но это мнение оказалось в корне неверным. Научные исследования продемонстрировали как повышенную частоту появления доброкачественных узлов, так и рака щитовидной железы. Современные литературные данные подтверждают, что у таких пациентов риск запуска канцерогенеза в разы выше, нежели у населения с нормальным функционированием щитовидной железы. Карцинома щитовидной железы при болезни Грейвса встречается не только с большей частотой, чем предполагалось, но и может протекать более агрессивно.

Заболеваемость карциномой щитовидной железы растет во всем мире. Поэтому важно знать о возможности развития рака щитовидной железы у пациентов с болезнью Грейвса и особенно внимательно относиться к пациентам с узловой патологией, необязательно с пальпируемыми узлами.

В нашей работе проанализированы литературные данные по раку щитовидной железы в сочетании с болезнью Грейвса, а также разобран клинический случай по данной проблеме.