

Яхимчик Д.Д., Адамович П.К.

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Научный руководитель: ст. преп. Макарова О.В.

Кафедра эндодонтии

Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск

Беременные женщины имеют высокий риск возникновения кариеса и заболеваний периодонта, а также обострения существовавших ранее хронических одонтогенных очагов инфекции. Это обусловлено деятельностью нейроэндокринной системы и формированием вторичного иммунодефицитного состояния (естественная иммуносупрессия предотвращает отторжение «наполовину» чужеродного плода). При эндодонтических вмешательствах у беременных женщин возникает ряд вопросов, касающихся местной анестезии, рентгенографии, электроодонтометрии, ультразвуковых методов лечения и применения анальгетиков. С момента подтверждения беременности помощь фактически предоставляется двум организмам. Беременная женщина – это жизнеобеспечение плода. Научно обоснованный подход к лечению болезней пульпы зуба и периапикальных тканей во время беременности – это безопасность и обеспечение благополучия пренатального периода и здоровья будущего ребенка.

Проанализировано 27 научных источников информации, касающихся эндодонтического лечения во время беременности.

По данным литературы неотложная помощь при острых воспалительных заболеваниях пульпы и периапикальных тканей проводится в любые сроки беременности. Бесконтрольное применение анальгетиков при боли недопустимо и не заменяет полноценного эндодонтического лечения. При проведении по показаниям эндодонтического лечения у беременных женщин важными факторами для выработки тактики специалистом являются выбор подходов к лечению, сроков вмешательства, медикаментов и проведения рентгенографии.

Современные исследования свидетельствуют, что при соблюдении научно обоснованных рекомендаций эндодонтическое лечение во время беременности является безопасным и способствует благополучию пренатального периода и здоровью будущего ребенка. Вместе с тем стоматологи должны проводить профилактическую работу среди женщин детородного возраста по санации полости рта до наступления беременности.