

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПРИЗЫВНИКОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

¹Метельский С.М., ²Горбарчук А.А., ²Кетрис А.С., ³Шнак П.А., ³Кецко В.А.,
³Саченко В.В., ³Ярошовец В.В.

¹ Военно-медицинский институт в учреждении образования «Белорусский
государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

²ГУ «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил
Республики Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь

³ГУ «432 Главный военный клинический медицинский центр ВС РБ»,
г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) относится к распространенным воспалительным заболеваниям дыхательных путей. В Республике Беларусь (РБ) за последние годы ежегодный прирост заболеваемости БА составляет от 3,5 до 4,3 тыс. человек. С января 2023 года в РБ действуют нормативные документы, позволяющие в ряде случаев при легкой БА признавать годными к военной службе в Вооруженных Силах (ВС) призывников и военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Цель исследования. Анализ структуры увольняемости военнослужащих срочной службы с БА, призванных в ВС РБ за период 2023-2024 гг.

Материалы и методы. Проанализированы все случаи увольнения из рядов ВС РБ по причине БА военнослужащих мужского пола, проходящих службу по призыву. Возраст пациентов – от 18 до 26 лет ($20,6 \pm 0,4$ года). Диагноз БА установлен в соответствии с критериями GINA (2024г.) и национального клинического протокола (2024г.). Основанием для увольнения стало обострение астмы, манифестация клинической симптоматики, персистирующее течение заболевания, потребовавшие назначения пациентам симптоматической и базисной терапии.

Результаты. Согласно статистическим отчетам, за 2 года (4 последовательных призыва) годными к военной службе с незначительными ограничениями по всей Республике Беларусь и призванными на срочную службу оказались 227 призывников с БА (в 2023г. – 71, в 2024г. – 156). За отчетный период по состоянию на начало весеннего призыва 2025г. из рядов ВС РБ уволены по болезни в связи с БА 42 военнослужащих срочной службы. Из всех уволенных 24 пациентам (57,1 %) диагноз астмы был впервые выставлен в период военной службы. В 18 случаях (42,9 %) пациенты были призваны в ВС РБ с установленным еще до призыва диагнозом БА. В последней группе военнослужащих астма в течение 5 лет перед призывом не имела клинических

проявлений, была контролируемой, с легким интермиттирующим течением, регулярная базисная и симптоматическая терапия пациентам не назначалась.

Возраст уволенных военнослужащих с верифицированной до призыва БА (n=18) составил от 18 до 26 лет ($20,8 \pm 0,4$ года). Анамнез (время от момента установления диагноза до медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией) – от 6 до 21 года ($15,5 \pm 0,9$). Время военной службы от момента призыва до госпитализации, по результатам которой последовало увольнение из ВС РБ по состоянию здоровья – от 4 до 327 суток ($2,9 \pm 0,6$ мес.).

Из всех призванных в ВС РБ военнослужащих срочной службы с БА за проанализированный календарных период (2 года) увольняемость по болезни составила лишь 7,9%.

Выводы. Согласно полученным результатам исследования, из общего числа призванных с астмой в ВС РБ военнослужащих с легкой астмой в подавляющем большинстве (92,1%) заболевание не препятствовало прохождению службы по призыву. Вместе с тем, учитывая возможность обострения заболевания и его прогрессирования, все военнослужащие с БА обязаны находиться под диспансерным наблюдением военных врачей, а командиры подразделений должны быть осведомлены о наличии данного заболевания у их подчиненных.