

Острожский Я. А.

**АРТЕРИАЛЬНЫЕ АНЕВРИЗМЫ У БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ 3-Й ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА МИНСКА**

Научный руководитель ассист. Суц Е. Л.

Кафедра акушерства и гинекологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Во время беременности сердечно-сосудистая система женщины испытывает повышенную нагрузку в связи с увеличением ОЦК, изменением характеристик выброса и функциональных объемов сердца, параметров артериального давления и др. Артериальные аневризмы, в свою очередь, повышают риски сердечно-сосудистых событий и увеличивают заболеваемость беременной женщины. Таким образом, изучение течения беременности и родов у женщин с артериальными аневризмами (АА) является актуальным.

Цель: изучить частоту встречаемости и тактику ведения беременных и рожениц с артериальными аневризмами.

Материалы и методы. В работу включены материалы стационарного лечения 26 беременных и рожениц в УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клунова» г. Минска с артериальной аневризмой в заключительном/направительном диагнозах за период с января 2014 по март 2022 года. Данное исследование является ретроспективным. Были применены статистический, аналитический методы исследования. Обработка данных проводилась при помощи Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23.

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе ($n = 26$) выделено две основные группы пациенток: группа беременных (ГБ) – 13 (50%), группа рожениц (ГР) – 13 (50%) пациентов. В группе ГР родоразрешились через естественные родовые пути (ЕРП) 8 человек (61,54% от ГР, 30,77% от всей выборки), путем операции кесарево сечение (КС) – 5 человек (38,46% от ГР, 19,23% от всей выборки). Метод выбора при оперативном родоразрешении – кесарево сечение в нижнем сегменте матки поперечным разрезом.

Средний возраст по всей выборке составил 31,35 лет, $Mo = 26$ лет ($min = 19$, $Q1 = 26,75$, $Me = 31,50$, $Q3 = 36,00$, $max = 40$). Количество койко-дней: среднее – 6,27 койко-дня, $Mo = 6$ койко-дня ($min = 2$, $Q1 = 4,75$, $Me = 6,00$, $Q3 = 8,00$, $max = 11$). Средний срок гестации составил 246,38 дня, $Mo = 280$ дней ($min = 142$, $Q1 = 218,25$, $Me = 257,00$, $Q3 = 280,00$, $max = 281$).

Необходимо отметить, что среди всех аневризм преобладает аневризма межпредсердной перегородки (АМПП) (23 пациента, 88,46%), которая в 13 случаях сочеталась с иной патологией: в 9 случаях (39,13% от всех АМПП) с пролапсом митрального клапана (ПМК), в 5 случаях (21,74%) с функционирующим овальным окном (ФОО), в 5 случаях (21,74%) с аномально расположенными хордами левого желудочка (АРХЛЖ). 3 и более патологии наблюдались у 5 пациентов, в основном, это сочетание АМПП, АРХЛЖ и ФОО.

25 (96,15%) пациентов выписано с улучшением, 1 беременная переведена в УЗ «6-я ГКБ» г. Минска в статусе с ложными схватками до 37 недель беременности в связи с появлением у нее коронавирусной инфекции. 1 роженице было проведено elective КС в связи с выявлением у нее коронавирусной инфекции.

Выводы. Артериальные аневризмы у беременных и рожениц представляют особый интерес для изучения. В структуре всех АА преобладает АМПП, которая часто сочетается с такими патологиями, как ПМК, ФОО, АРХЛЖ. Родоразрешение выполнено в половине всех случаев. Необходимо дальнейшее изучение данной патологии у беременных и рожениц для повышения статистической значимости возможных зависимостей.