

Берёзко Е.А.

**ОСТРАЯ ТРАВМА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ:
СТРУКТУРА, РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ, ПРИЧИНЫ**

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Шаковец Н.В., ст. преп. Зенькевич Ю.В.

*Кафедра стоматологии детского возраста, кафедра челюстно-лицевой хирургии
и пластической хирургии лица*

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Травматические повреждения зубов составляют 10-15% в структуре стоматологических заболеваний и наиболее распространены в детском и подростковом возрасте. Они часто являются причиной первого визита в стационар для оказания неотложной помощи. Прогноз для зубов зависит от типа травмы, неотложной помощи и времени, прошедшего до оказания специализированной врачебной помощи. Структурированный подход к оказанию помощи при травматических повреждениях зубов имеет важное значение как для врачей-стоматологов, так и для родителей, так как позволяет минимизировать не только клинические, но и эстетические, функциональные и психологические последствия.

Цель: ретроспективный анализ закономерностей и типов травматических повреждений зубов у детей, обратившихся за медицинской помощью в стационар.

Материалы и методы. Нами проведено ретроспективное исследование, включающее всех детей с острой травмой постоянных и временных зубов, обратившихся в УЗ «4 городская детская клиническая больница г. Минска» (далее 4 ГДКБ) в 2024 году. Были изучены истории болезни, проведен анализ жалоб, анамнеза травматического повреждения, сроков обращения за медицинской помощью, проведенного лечения. Статистическая обработка данных проведена методами описательной статистики в программе Excel-2019, различия определяли по критерию хи-квадрат и считали значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Согласно данным отдела медицинской статистики в 2024 году в 4 ГДКБ по поводу травматических повреждений зубов обратились 102 пациента, однако данные в полном объеме были представлены у 100, из них в возрасте до 3-х лет - 48%, 3-6 лет - 30% 7-17 лет - 22%. Мальчиков было в 2 раза больше, чем девочек (66% к 34%). Количество травмированных зубов у одного пациента колебалось от 1 до 4, и всего составило 164. Наиболее часто наблюдалась травма центральных и боковых резцов верхней челюсти (92,1%, $n=151$; $p < 0,001$). Вывихи составили 65,2% ($n=107$, $p < 0,05$), из которых в 53% случаев ($n=87$) определена люксация зуба. Перелом зуба диагностирован в 34,8% зубов ($n=57$), из которых 12,3% были постоянными. Большинство травматических инцидентов (63%) произошли в осенне-летний период дома или на прогулке (88,5%). Временные зубы в 100% случаев были удалены, постоянные - в 2%, а остальные были лечены консервативным способом и шинированы.

Выводы. В структуре обращений за медицинской помощью в стационар значительную часть составляет острая травма зубов у детей в возрасте до 3 лет, что обусловлено особенностью их поведения и невозможностью обеспечения адекватного обезболивания в амбулаторных условиях. Однако при травматических повреждениях постоянных зубов более чем в половине случаев стоматологическая помощь могла быть оказана в амбулаторных условиях, что снизит нагрузку на врачей стационара.