

Кейдо М.И., Кучейко К.И.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ

Научный руководитель: канд. мед. наук, ст. преп. Петрович Н.И.

Кафедра стоматологии детского возраста

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. В настоящее время актуальной проблемой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии продолжают оставаться воспалительные заболевания челюстно-лицевой области (ЧЛО). Дети с воспалительными заболеваниями ЧЛО составляют 50,5% от числа пациентов, находящихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии (из них воспалительных заболеваний мягких тканей – 9,6%, костей лицевого скелета – 19,2% и обострений хронических периодонтитов зубов – 21,6%). В подростковом возрасте среди заболеваний мягких тканей чаще встречаются абсцедирующие фурункулы лица. Среди воспалительных заболеваний костей лицевого скелета у детей чаще встречаются острые периоститы и остеомиелиты челюстей (24,17%) и 15,42% случаев дети с обострениями хронических периодонтитов (Корсак А.К. и соавт., 2012).

Цель: изучить обращаемость детей с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области за оказанием стационарной хирургической помощи в зависимости от пола, возраста и вида патологии.

Материалы и методы. Изучены архивные материалы стоматологических карт 1410 детей с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи в возрасте от 1 года до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии в УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска в 2023 году.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что среди всех детей (3110), обратившихся за оказанием стационарной хирургической помощи, дети с воспалительными заболеваниями составили 45,34%± 0,27%. Выявлено, что мальчики обращались за оказанием стационарной помощи в 1,3 раза чаще, чем девочки (56,60±1,75% и 43,40±2,0%). Одинаково часто обращаются дети в возрасте от 1-5 лет и 6-11 лет (42,34%±2,02% и 44,18%±1,99%), а дети старшего школьного возраста обращаются в 3 раза реже, чем дети младшего школьного возраста (13,48%±2,48%). Наиболее часто обращались за оказанием стационарной помощи дети с острым гнойным периоститом челюстей (39,93%±2,06%) и с обострением хронического апикального периодонтита зубов (42,48%±4,08%). Среди воспалительных заболеваний мягких тканей ЧЛО чаще встречались абсцедирующие фурункулы лица (6,03%±2,58%). На стационарном лечении дети с воспалительными заболеваниями ЧЛО находились от 1 до 22 койко-дней, что в среднем составило 4,71 койко-дня.

Выводы:

1. Среди всех детей, обратившихся за оказанием стационарной стоматологической хирургической помощи, дети с воспалительными заболеваниями составили 45,34%.
2. Воспалительные заболевания диагностировались у мальчиков в 1,3 раза чаще, чем у девочек и чаще в возрасте 6-11 лет (44,18%).
3. Большая часть детей находилась на стационарном лечении с острым гнойным периоститом челюстей (39,93%) и с обострением хронического апикального периодонтита зубов (42,48%).
4. Продолжительность лечения детей с воспалительными заболеваниями ЧЛО в стационаре колебалась от 1 до 22 койко-дней и в среднем составила 4,71 койко-дня.