

Ивашкевич Д.В., Когония Н.В.

НУЖДАЕМОСТЬ В САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Научный руководитель: канд. мед. наук, ст. преп. Петрович Н.И.

Кафедра стоматологии детского возраста

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Особую группу saniрующих полость рта в условиях общего обезболивания детей, составляют дети с неврологическими заболеваниями (детский церебральный паралич, эпилепсия), а также аутизмом, синдромом Дауна и другими заболеваниями, при лечении зубов, у которых всегда существует опасность возникновения осложнений.

Цель: изучить потребность в терапевтической и хирургической стоматологической помощи детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в санации полости рта в условиях общего обезболивания.

Материалы и методы. Изучен архивный материал стоматологических карт 128 детей с ограниченными возможностями в возрасте от 1 года до 17 лет, обратившихся в 2023-м году за санацией полости рта в условиях общего обезболивания в УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска.

Результаты и их обсуждение. Среди всех детей (660), saniрующих полость рта в условиях общего обезболивания, дети с ограниченными возможностями составили $19,39 \pm 3,49\%$. Выявлено, что санация полости рта в условиях общего обезболивания оказывалась в 2,28 раз чаще мальчикам, чем девочкам ($69,53\%$ и $30,47\%$). Дети в возрасте от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет одинаково часто нуждались в оказании стоматологической помощи ($43,75 \pm 6,62\%$) и в 3,5 чаще, чем дети в возрасте от 1 до 5 лет ($12,50 \pm 8,53\%$). У 128 детей с ограниченными возможностями было вылечено и удалено 779 временных и постоянных зубов, из них вылечено 630 ($88,87 \pm 1,41\%$) зубов по поводу кариеса и пульпита, из них 275 временных зубов ($43,65 \pm 2,99\%$) и 355 постоянных зубов ($56,35 \pm 2,63\%$). Всего удалено 149 ($19,13 \pm 1,41\%$) зубов по поводу хронического апикального периодонтита и его обострения, из них 111 ($74,49 \pm 4,14\%$) временных зубов и 38 ($25,51 \pm 7,07\%$) постоянных зубов.

Выводы:

1. Среди всех детей, saniрующих полость рта в условиях общего обезболивания, дети с ограниченными возможностями составляют 19,4%.
2. Санация полости рта в условиях общего обезболивания в 2,3 раза чаще проводилась мальчикам, чем девочкам, и чаще в возрасте от 6 до 17 лет.
3. В среднем в условиях общего обезболивания каждый ребенок нуждался в лечении или удалении 6,09 зубов, из них 1,16 зубов были удалены.
4. Количество зубов, подлежащих лечению, в 4 раза превышало количество зубов, которые следовало удалить.