

*Грабовская В.С.***ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ О ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ***Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Шаковец Н.В.**Кафедра стоматологии детского возраста**Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Актуальность. Травма зубов занимает пятое место среди наиболее распространенных заболеваний или повреждений в детском возрасте. Одним из важных факторов, определяющих дальнейшую судьбу зуба, является время, в течение которого ребенок обращается к врачу-стоматологу: чем оно меньше, тем выше шанс спасти зуб.

Цель: выявить знания студентов-медиков Белорусского государственного медицинского университета о тактике действий при возникновении травматических повреждений зубов.

Материалы и методы. Для исследования были разработаны анкеты, включающие вопросы о дальнейших действиях студентов-медиков разных факультетов в случае травмы зуба, о возможностях восстановить поврежденный зуб и о мерах профилактики травматических повреждений в челюстно-лицевой области. В анонимном опросе приняли участие 178 студентов стоматологического ($n=61$), лечебного ($n=62$) и педиатрического ($n=55$) факультетов БГМУ. Данные статистически обработаны.

Результаты и их обсуждение. При анализе результатов анкетирования установлено, что почти 2/3 опрошиваемых встречались с травмой зуба ($64,0 \pm 3,6\%$). Большая часть студентов ($62,4 \pm 3,6\%$) склоняются к как можно раннему посещению стоматолога в случае травматического повреждения (в течение 1-2 часов). В качестве мер первой помощи при ушибе зуба более половины респондентов ($61,8 \pm 3,6\%$) полагают, что следует приложить лед к зубу, затрудняются ответить $21,9 \pm 3,1\%$ и считают, что ничего делать не стоит $16,3 \pm 2,8\%$. С вариантом ответа, что отломок зуба нужно сохранить, и стоматолог может «приклеить» фрагмент, согласны, $44,9 \pm 3,7\%$ студентов, однако $30,3 \pm 3,4\%$ считают, что фрагмент можно выбросить и $24,7 \pm 3,2\%$ затрудняются с ответом. Выявлено, что около половины студентов лечебного факультета ($43,5 \pm 6,3\%$) и большая часть студентов-педиатров ($58,2 \pm 6,7\%$) уверены, что выбитый зуб не следует вставлять обратно в лунку, $39,3 \pm 6,3\%$ студентов стоматологического факультета думают так же. На вопрос, можно ли промывать отломок зуба водой, затрудняются ответить $41,9 \pm 6,3\%$ студентов лечебного и $45,5 \pm 6,7\%$ педиатрического факультетов. Большинство учащихся лечебного факультета считают, что выбитый постоянный зуб следует хранить завернутым в салфетке/бинте ($51,6 \pm 6,3\%$) или в солевом растворе ($41,9 \pm 6,3\%$), такого же мнения придерживаются студенты педиатрического факультета ($61,8 \pm 6,6\%$ и $36,4 \pm 6,5\%$ соответственно); однако $52,5 \pm 6,4\%$ студентов-стоматологов полагают, что зуб следует хранить в молоке или в слюне/во рту за щекой ($41 \pm 6,3\%$). Большинство респондентов полагает, что предотвратить травму зубов можно при использовании защитных шин во время занятий травмоопасными видами спорта ($89,3 \pm 2,3\%$), однако $9,0 \pm 2,1\%$ не верят в возможность предупреждения травмы. Работающие студенты-стоматологи подтвердили, что сталкиваются с повреждениями зубов у пациентов 3-5 раз в месяц ($2,2 \pm 2,2\%$) или 6-9 раз в месяц ($2,2 \pm 2,2\%$).

Выводы: в результате исследования выявлен недостаточный уровень знаний студентов БГМУ о тактике действий при травме зубов, которые отличаются у учащихся разных факультетов. Анализ полученных данных позволит разработать практические рекомендации для повышения уровня знаний студентов по вопросам оказания первой медицинской помощи детям с травматическими повреждениями.