

А.А. Анисова, З.М.Х. Аль-Шинджилъ
**ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОСТПЛОМБИРОВОЧНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ-
ТЕРАПЕВТОВ**

*Научные руководители: д-р. мед. наук, проф. А.В. Бутвиловский,
канд. мед. наук, доц. Л.Н. Полянская
Кафедра эндодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

A.A. Anisova, Z.M.H. Alshnjeel
**FREQUENCY OF POSTOPERATIVE TOOTH SENSITIVITY IN PRACTICE
OF DENTISTS**

*Tutors: PhD, professor A.V. Butvilovsky, PhD, associate professor L.N. Polyanskaya
Department of Endodontics
Belarusian State Medical University, Minsk*

Резюме. В данной статье представлен анализ анкетирования практикующих врачей-стоматологов, направленный на выявление частоты встречаемости постпломбировочной чувствительности у их пациентов.

Ключевые слова: постпломбировочная чувствительность, стоматологическое лечение, реставрационная терапия.

Resume. This article presents an analysis of a survey conducted among practicing dentists aimed at identifying the frequency of postoperative tooth sensitivity in their patients.

Keywords: postoperative sensitivity, dental treatment, restorative therapy.

Актуальность. Постпломбировочная чувствительность зубов является одной из наиболее распространенных жалоб пациентов после проведения терапевтического лечения [1]. Несмотря на развитие современных материалов и технологий, случаи постпломбировочной чувствительности продолжают встречаться в клинической практике и могут вызывать значительный дискомфорт у пациентов, снижая качество жизни и уровень доверия к врачу-стоматологу [2, 3]. В условиях постоянно растущих требований к качеству стоматологической помощи, данная проблема приобретает особую значимость. По данным литературы частота постоперативной чувствительности варьирует от 5 до 30% [4]. Именно поэтому изучение данной темы актуально для повышения качества оказания терапевтической стоматологической помощи и оптимизации клинических подходов в повседневной практике.

Цель: определить частоту встречаемости постпломбировочной чувствительности зубов в практике врачей-стоматологов-терапевтов.

Задачи:


1. Проанализировать данные анонимного анкетирования врачей-стоматологов.
2. Оценить частоту возникновения постпломбировочной чувствительности у пациентов врачей различных квалификационных категорий.

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 365 практикующих врачей-стоматологов, работающих в частных и государственных структурах здравоохранения Республики Беларусь.

Для сбора данных использовался структурированный анкетный опросник, включающий вопросы о стаже работы, квалификационной категории, применяемых методах лечения, используемых материалах и частоте случаев постпломбировочной чувствительности. Все респонденты были разделены на две группы: в группу 1 включены 145 респондентов без категории или со второй категорией, в группу 2 – 220 респондентов с первой или высшей категорией.


Данные были систематизированы в таблице Microsoft Excel и проанализированы с использованием методов описательной статистики и критерия χ^2 для определения статистической значимости различий между группами.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что большинство респондентов (95,9%) сталкиваются в своей практике с проблемой постоперативной чувствительности зубов. Установлено, что среди респондентов стаж работы менее 5 лет имеют 75 (20,5%) человек, от 5 до 10 лет – 54 (14,8%), 11-15 лет – 59 (16,2%) и более 15 лет – 177 (48,5%) человек.




Диагр. 1 – Стаж работы респондентов

Из первой группы 2,76% респондентов не встречаются в практике постпломбировочную чувствительность, 65,51% респондентов встречаются очень редко, 28,97% респондентов – редко, 2,76% респондентов – достаточно часто.



Диагр. 2 – Частота встречаемости постпломбировочной чувствительности в первой группе

Из второй группы 5% респондентов не встречаются в практике постпломбировочную чувствительность, 60,91% респондентов встречаются очень редко, 28,18% респондентов – редко, 5,91% респондентов – достаточно часто.



Диагр. 3 – Частота встречаемости постпломбировочной чувствительности во второй группе

При сравнении частоты встречаемости постоперативной чувствительности в сформированных группах статистически значимых отличий не обнаружено ($\chi^2 = 3.23$, $p > 0,05$).

Выводы:

1. Большинство респондентов (95,9%) сталкиваются в своей практике с проблемой постоперативной чувствительности зубов.
2. В сформированных группах частота встречаемости постпломбировочной чувствительности зубов не отличалась.
3. Проведенное исследование свидетельствует об актуальности проблемы постоперативной чувствительности зубов и необходимости проведения дальнейших экспериментальных и клинических исследований в этом направлении.

Литература

1. Анализ причин возникновения постпломбировочной боли при лечении неосложнённого кариеса / А. В. Юркевич, М. Б. Сувырина, А. Б. Чабан, Т. Е. Круглов // Казанский медицинский журнал. – 2018. – № 3. – С. 380-385.
2. Изучение качества жизни пациентов при осложнениях, возникших после стоматологических вмешательств / Э. Г. Борисова, Э.С. Грига, М. К. Федичкина, Л. И. Шеенко // Проблемы стоматологии. – 2019. – Т. 15, № 3. – С. 23–27.
3. Петражицкая, Н. В. Изучение мнения врачей-стоматологов о проблеме возникновения постпломбировочных болей при использовании фотоотверждаемых композиционных материалов / Н.В. Петражицкая, И.М. Сёмченко // сб. науч. тр. – Минск, 2017. – С. 442-445.
4. Bhatti U. A. The phenomenon of postoperative sensitivity and composite restorations: a review. / U. A. Bhatti // Journal of the Pakistan Dental Association. – 2019. – Vol. 28, № 1. – P. 33–40.