

Л.А. Лавник, Е.И. Зинкевич
СТИГМАТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Научный руководитель: ст. преп. Н.А. Емельянова
Кафедра пульмонологии, фтизиатрии, аллергологии и профпатологии
с курсом повышения квалификации и переподготовки
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

L.A. Lavnik, E.I. Zinkevich
STIGMATIZATION OF TUBERCULOSIS PATIENTS

Tutor: senior lecturer N.A. Yemelyanova
Department of Pulmonology, Phthiology, Allergology and Occupational Pathology
with Advanced Training and Retraining Course
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Туберкулез относится к социально значимым заболеваниям, поэтому вопрос стигматизации данных пациентов является актуальной проблемой на данный момент. В данной работе мы рассмотрим отношение студентов различных учреждений образования к пациентам, болеющим туберкулезом.

Ключевые слова: туберкулез, стигматизация, шкала Van Rie.

Resume. Tuberculosis is a socially significant disease, so the issue of stigmatization of these patients is an urgent problem at the moment. In this paper, we will consider the attitude of students from various educational institutions towards patients suffering from tuberculosis.

Keywords: tuberculosis, stigmatization, the Van Rie scale.

Актуальность. Стигматизация – формирование негативного, предвзятого отношения к человеку или определенной группе людей на основании определенных психических, физических, интеллектуальных особенностей. Туберкулез относится к стигматизированным заболеваниям вследствие отношения к нему как к заболеванию социально неблагополучных слоев населения. Дискриминация обществом определенной группы лиц приводит к ухудшению качества жизни последних, нежелание быть изгоями приводит к сокрытию признака, что в отношении инфекционных заболеваний способствует их распространению, снижению диагностики и лечения [3, 4].

Цель: изучить отношение студентов БГМУ и других ВУЗов к пациентам с туберкулезом по результатам анкетирования.

Задачи:

1. Изучить стигматизацию пациентов с туберкулезом среди студентов двух групп (студенты медицинских и иных ВУЗов).
2. Оценить степень стигматизации пациентов с туберкулезом среди студентов медицинских и иных ВУЗов.

Материалы и методы. Были отобраны две группы студентов, где студенты первой группы обучаются в БГМУ (№1), второй – в иных ВУЗах Беларуси (№2). Возраст студентов составил от 17 до 23 лет. Число людей в обеих группах составило 60. Число девушек и парней в первой группе составило 44 и 16, во второй – 22 и 38. Студентам была предложена анкета из 9 вопросов, основой которой послужила

шкалы стигматизации при туберкулезе Van Rie (VTSS) (рис. 1). Вопросы относились к категориям: беспокойство за свое здоровье (№1, 2, 4, 7), негативное отношение к пациентам (№3, 5, 6, 8, 9). Выбор шкалы был основан на ее высоком уровне внутренней согласованности и валидности относительно вопросов стигматизации [1, 2]. Анкетирование проходило с помощью платформы Google Forms.




Рис. 1 – Опросник, взятый за основу для анкеты

Результаты и их обсуждение. На вопрос «Я бы не хотел есть или пить с друзьями, болеющими туберкулезом» в группе №1 положительный ответ дал 41 человек (68,2%), в №2 – 39 (65,0%). На вопрос «Я чувствую себя некомфортно рядом с больными туберкулезом» в группе №1 положительный ответ дало 42 человек (70,0%), в №2 – 43 (71,6%). На вопрос «Я отношусь к больным туберкулезом по-другому, чем к остальным людям» в группе №1 положительный ответ дало 17 человек (28,3%), в №2 – 27 (45,0%). На вопрос «Я держусь на расстоянии от больных туберкулезом» в группе №1 положительный ответ дало 44 человека (73,4%), в №2 – 45 (75,0%). На вопрос «Я с презрением отношусь к больным туберкулезом» в группе №1 положительный ответ дало 2 человека (3,3%), в №2 – 10 (16,7%). На вопрос «Я не хочу общаться с больными туберкулезом» в группе №1 положительный ответ дало 20 человек (33,3%), в №2 – 31 (51,7%). На вопрос «Я боюсь больных туберкулезом» в группе №1 положительный ответ дало 32 человека (53,3%), в №2 – 35 (58,3%). На вопрос «Я предпочитаю, чтобы больные туберкулезом были изолированы от общества» в группе №1 положительный ответ дало 23 человека (38,3%), в №2 – 26 (43,3%). На вопрос «Я считаю, что пациенты, имеющие туберкулез, сами виноваты в

том, что заболели» в группе №1 положительный ответ дало 2 человека (3,3%), в №2 – 7 (11,7%). В отношении вопросов, касающихся беспокойства за здоровье, уровень значимости при $\alpha=0,05$ составил $p>0,1$, в отношении вопросов дискриминации пациентов – $p<0,1$ для 3, 5, 6 вопросов.

Табл. 1. Результаты анкетирования (блок вопросов «беспокойство за свое здоровье»)

Вопрос	Группа №1	Группа №2
1. «Я бы не хотел есть или пить с друзьями, болеющими туберкулезом»	68,2%	65%
2. «Я чувствую себя некомфортно рядом с больными туберкулезом»	70%	71,6%
4. «Я держусь на расстоянии от больных туберкулезом»	73,4%	75%
7. «Я боюсь больных туберкулезом»	53,3%	58,3%

Табл. 2. Результаты анкетирования (блок вопросов «негативное отношение к пациентам»)

Вопрос	Группа №1	Группа №2
3. «Я отношусь к больным туберкулезом по-другому, чем к остальным людям»	28,3%	45%
5. «Я с презрением отношусь к больным туберкулезом»	3,3%	16,7%
6. «Я не хочу общаться с больными туберкулезом»	33,3%	51,7%
8. «Я предпочитаю, чтобы больные туберкулезом были изолированы от общества»	38,3%	43,3%
9. «Я считаю, что пациенты, имеющие туберкулез, сами виноваты в том, что заболели»	3,3%	11,7%

Выводы:

1. Студенты БГМУ и иных ВУЗов с одинаковой частотой ответили на вопросы беспокойства за свое здоровье при общении с больными туберкулезом (ответы имели отличие 1-3 человека в пользу одной из групп, что не является значительной статистической разницей). Обе группы студентов дали более 50% положительных ответов на вопросы 1, 2, 4, 7.

2. Студенты иных ВУЗов с большей частотой дали статистически значимые положительные ответы на вопросы дискриминации и изоляции пациентов с туберкулезом.

3. Среди студентов иных ВУЗов в большей степени отмечается стигматизация пациентов с туберкулезом в сравнении со студентами БГМУ.

Литература

1. Fuady, A., Arifin, B., Yunita, F. et al. Stigma towards people with tuberculosis: a cross-cultural adaptation and validation of a scale in Indonesia. BMC Psychol 11, 112 (2023).
2. Saha A, Kumar A, Jain A, Pratibha, Ranjan R. Cross-cultural reliability of Van Rie TB perceived Stigma Scale among TB survivors in North India. Indian J Tuberc. 2024;71 Suppl 2:S221-S224. doi: 10.1016/j.ijtb.2024.08.009. Epub 2024 Aug 20. PMID: 39370187.
3. Ващёнок, Н. И. Степень стигматизации пациентов с туберкулезом [Электронный ресурс] / Н. И. Ващёно, К. В. Дорофеева // Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых, Гомель, 2-3 мая 2019 г. : в 8 т. / Гомел. гос. мед. ун-т ; редкол. : А. Н. Лызииков [и др.]. – Гомель: ГомГМУ, 2019. – Т. 3. – С. 214-215. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Научный руководитель: к.м.н., доцент Г. Л. Бородина
4. Стигма в психиатрии и фтизиатрии. Взгляд психиатра / В. А. Абрамов, Т. Л. Ряполова, С. М. Лепшина и др. // Университетская клиника. – 2016. – № 3. – С. 84-88.