

*Лебецкая Е.В.*

## **ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ И ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕРПЕТИЧЕСКИМ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОМ**

*Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кучук Э.Н.*

*Кафедра патологической физиологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Поражение центральной нервной системы в виде герпетического менингоэнцефалита продолжает быть актуальной проблемой в практической деятельности врачей многих специальностей, в том числе, психиатров, неврологов, инфекционистов. Это обусловлено широкой распространенностью данного вируса. Ведь носителями вируса простого герпеса является 90% всей популяции земного шара. В свою очередь герпетический менингоэнцефалит встречается с частотой 1 на 250 - 500 тысяч. Он имеет тяжелый характер течения, что приводит к повышению уровня инвалидизации и уровню летальности. И как итог это принесит социально-экономический ущерб всему обществу.

**Цель:** проанализировать возрастную и половую структуру для выявления группы повышенного риска тяжелого течения данной патологии. А также длительность госпитализации и количество расхождений клинического и патологоанатомического диагноза для повышения настороженности врачей.

**Материалы и методы.** В ходе, проделанной работы был проведен ретроспективный анализ протоколов патологоанатомических вскрытий пациентов страдавших герпетическим менингоэнцефалитом, которые проходили лечение в РНПЦ Психического Здоровья в период с 2000 по 2023 год. Выборочная совокупность составила 57 пациентов, из них 28 женщин и 29 мужчин. Оценивались длительность госпитализации, возрастная структура, количество расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов, клинический диагноз.

**Результаты и их обсуждение.** Было получено, что почти с одинаковой частотой от герпетического менингоэнцефалита умирали мужчины и женщины. Среди которых основную когорту умерших, составляли пациенты от 40 до 69 лет. Длительность госпитализации составляла до 30 дней в 73,68%. Сама же герпетическая инфекция – герпетический менингоэнцефалит протекал в 3 формах, а именно хронической (53 пациента), подострой (1 пациент) и острой (3 пациента). Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов отмечалось в 21,05% (12 случаев). Клинически выставлялся диагноз органического психического расстройства (12 случаев), а также параноидной формы шизофрении (17 случаев) в большинстве случаев.

**Выводы.** Герпетический менингоэнцефалит чаще встречался в возрасте 40-69 лет и не имел связи с полом пациента. Наиболее часто данная патология протекала в хронической форме и сопровождалась психическими расстройствами, что привело к расхождению клинического и патологоанатомического диагнозов (21,05%).