

Соловей Д.А., Журихо А.В.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АУТОИММУННОГО ГАСТРИТА С ДРУГИМИ АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ОПУХОЛЕВЫМИ ТРАНСФОРМАЦИЯМИ

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Анфиногенова Е.А.

*Кафедра патологической анатомии и судебной медицины с курсом повышения квалификации
и переподготовки*

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Актуальность изучения обусловлена ростом заболеваемости, сложностью диагностики, связью с другими заболеваниями, риском осложнений. Таким образом, исследование аутоиммунного гастрита (АГ) имеет высокую значимость как для медицины, так и для улучшения качества жизни пациентов.

Цель: провести анализ частоты встречаемости АГ с другими аутоиммунными заболеваниями (АИЗ) и опухолевыми трансформациями (ОТ).

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил гастробиопсии 150 пациентов (112 женщин и 38 мужчин) УЗ «Минский клинический консультационно-диагностический центр» (УЗ «МККДЦ») за период с 01.01.2024 по 01.04.2024. Методы исследования: морфологический, статистический.

Результаты и их обсуждение. В структуре биопсийного материала УЗ «МККДЦ» доля АГ составляет 5,82% (2580/44337). Средний возраст (СВ) пациентов $61,4 \pm 13,9$ (от 23 до 88) года (мода - 75,0; медиана - 65,0). СВ женщин - $62,5 \pm 13,6$ (от 24 до 88) года (мода - 75,0; медиана - 65,5), СВ мужчин - $58,1 \pm 14,5$ (от 23 до 81) лет (мода - 67,0; медиана - 59,0).

У 24,67% пациентов были диагностированы сопутствующие АИЗ ($n=37/150$). В 83,78% АИЗ встречалась у женщин ($n=31/37$), и в 16,22% у мужчин ($n=6/37$). Структура АИЗ: аутоиммунный тиреоидит (АИТ) - 10,81% ($n=4/37$), ревматоидный артрит (РА) - 8,11% ($n=3/37$), хронический тиреоидит (ХТ) - 5,41% ($n=2/37$), системная красная волчанка (СКВ) - 2,70% ($n=1/37$), синдром Шегрена (СШ) - 2,70% ($n=1/37$), первичный билиарный цирроз (ПБЦ) (аутоиммунный генез) - 2,70% ($n=1/37$), тиреотоксикоз (ТТ) - 2,70% ($n=1/37$), рассеянный склероз (РС) - 2,70% ($n=1/37$), идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) - 2,70% ($n=1/37$). Среди АИЗ у мужчин наблюдался только АИТ - 16,67% ($n=1/6$), у женщин встречались АИТ - 9,68% ($n=3/31$), РА - 9,68% ($n=3/31$), ХТ - 6,45% ($n=2/31$), СКВ - 3,23% ($n=1/31$), СШ - 3,23% ($n=1/31$), ПБЦ (аутоиммунный генез) - 3,23% ($n=1/31$), ТТ - 3,23% ($n=1/31$), РС - 3,23% ($n=1/31$), ИТП - 3,23% ($n=1/31$).

У 26% ($n=39/150$) (82,1% ($n=32/39$) – женщины, 17,9% ($n=7/39$) – мужчины) пациентов выявлена анемия (А), среди которых 7,7% ($n=3/39$) витамин-В12-дефицитной А в сочетании с железодефицитной А (ЖА). Среди всех выявленных случаев А витамин-В12-дефицитные составляли - 71,43% ($n=30/42$), ЖА - 16,67% ($n=7/42$), фолиеводефицитные А (ФА) - 11,90% ($n=5/42$). Среди мужчин витамин-В12-дефицитная А встречается в 62,5% ($n=5/8$) случаев, ЖА в 25% ($n=2/8$), ФА - 12,5% ($n=1/8$). Среди женщин витамин-В12-дефицитная А встречается в 73,53% ($n=25/34$) случаев, ЖА в 14,71% ($n=5/34$), ФА - 11,76% ($n=4/34$).

ОТ были обнаружены у 4% ($n=6/150$) пациентов, из них опухоли пищеварительной системы 50% ($n=3/6$): тубулярная аденома толстой кишки - 66,6% ($n=2/3$), нейроэндокринная опухоль - 33,3% ($n=1/3$); лимфоидный лейкоз - 16,67% ($n=1/6$), меланома кожи - 16,67% ($n=1/6$); аденокарцинома предстательной железы - 16,67% ($n=1/6$).

Выводы. Частота выявления АГ при анализе гастробиопсии УЗ «МККДЦ» 5,82% (2580/44337). Возрастной профиль пациентов $61,4 \pm 13,6$ года. Частота встречаемости АГ среди женщин в 2,95 раз выше. У 24,67% пациентов были диагностированы сопутствующие АИЗ ($n=37/150$), которые в 83,78% встречались у женщин ($n=31/37$), и в 16,22% у мужчин ($n=6/37$).

У 26% ($n=39/150$) пациентов выявлена анемия, среди них 82,1% ($n=32/39$) – женщины, 17,9% ($n=7/39$) – мужчины.