

Рустамова Г.Х.

**АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВОЙ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В УЗ «3-Я ГКБ ИМЕНИ Е.В. КЛУМОВА»
Г. МИНСКА**

Научный руководитель: преподаватель-стажер. Острожский Я.А.

*Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Актуальность. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки (далее – ЯЖ, ЯДПК) представляет собой длительно незаживающий дефект стенки одноименных органов. Несмотря на широкое и успешное в большинстве случаев применение консервативной терапии, данная патология все ещё требует применения хирургических методов лечения. Ежегодно в Беларуси частота заболеваний колеблется в пределах 350–450 человек на 100.000 населения. Широкая распространённость данной патологии среди разных групп лиц указывает на необходимость анализа характеристик пациентов с данной патологией.

Цель: проанализировать характеристики пациентов, подвергшихся хирургическому лечению по поводу язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены материалы 653 вмешательств по диагностике и лечению пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, из них проанализированы 80, приходящиеся на хирургическую коррекцию основной патологии. Пациенты отобраны в анализ по заключительному диагнозу ЯЖ и ЯДПК после завершения лечения в УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» г. Минска за период с 2019 по 2024 гг.

Аналізу подверглись данные по полу, возрасту, инвалидности, экстренности проводимого лечения, длительности пребывания в стационаре, клиническому исходу. Применены статистический и аналитический методы исследования. Обработка данных проводилась с использованием Jamovi 2.6.19, Excel 2013.

Результаты и их обсуждение. За период с 2019 по 2024 гг. рассчитана структура, согласно которой среди пациентов, подвергшихся хирургическому лечению по поводу ЯЖ и ЯДПК, было 52 (65,0%) мужчины, из них 80,8% – лица трудоспособного возраста. Среди женщин (n = 28 (35,0%)) доля лиц трудоспособного возраста составила 25,0%.

Инвалидность наблюдалась у 15 (18,8%) лиц. Отмечено наличие пациентов с инвалидностью 1-й (20,0%), 2-й (40,0%) и 3-й (40,0%) групп.

В экстренном порядке поступило 78 (97,5%) пациентов. В подавляющем большинстве случаев пациенты выписаны с улучшением либо без перемен (98,8%).

Статический анализ позволил определить средний возраст по всей группе – 52,0 года ($Q_1 = 36,0$, $Me = 53,0$, $Q_3 = 67,0$); длительность операций (в минутах) – 94,9 ($Q_1 = 60,0$, $Me = 90,0$, $Q_3 = 120,0$) и длительность нахождения в стационаре (в койко-днях) – 10,7 ($Q_1 = 6,0$, $Me = 8,0$, $Q_3 = 14,0$).

Выводы. ЯЖ и ЯДПК – широко распространенная патология, требующая комплексного подхода к лечению, учитывающего как физиологические, так и эмоциональные аспекты здоровья. Развитие осложнений возможно предотвратить при своевременно проведенной профилактике и диагностике. Согласно проведенному исследованию ЯЖ и ЯДПК чаще подвержены лица мужского пола (65,0%). Средний возраст поступивших с данным диагнозом составил 52,0 года, исходя из этого, можно сделать вывод, что данная патология чаще встречается у трудоспособного населения, создавая значимые предпосылки к приобретению населением временной нетрудоспособности и, в конечном счете, к снижению качества жизни. В подавляющем большинстве случаев (98,8%) прогноз после проведенного оперативного вмешательства – благоприятный.