

Украинец Я.В., Матыгин А.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ В 2019
И В 2023 ГОДАХ

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Навроцкий А.Л.
*Кафедра дерматовенерологии и косметологии с курсом повышения квалификации
и переподготовки*
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Сифилис – инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum*. Заболевание характеризуется хроническим течением и многообразием клинических форм. Изучение заболеваемости сифилисом позволяет отслеживать и прогнозировать дальнейшую эпидситуацию, вводить новые и корректировать имеющиеся методы диагностики, профилактики и лечения сифилиса.

Цель: провести ретроспективный анализ заболеваемости различными формами сифилиса в 2019 и в 2023 годах и выявить основные тенденции заболеваемости сифилисом.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ заболеваемости различными формами сифилиса в 2019 и в 2023 годах с применением данных статистической отчетной документации: «Отчет об инфекциях, передаваемых преимущественно половым путем, микозах и инфеcтациях» за 2019 и 2023 годы.

Результаты и их обсуждение. Ретроспективный анализ заболеваемости различными формами сифилиса в 2019 году и в 2023 году показал следующее. Число случаев всех форм сифилиса составило в 2019 году 395 случаев, а в 2023 году – 1111 случаев. В 2019 году пик заболеваемости среди женщин наблюдался в возрасте 40-49 лет (34,3%), среди мужчин – в возрасте более 50 лет (37,0%). В 2023 году пик заболеваемости и среди женщин, и среди мужчин был в возрасте более 50 лет (46,6% и 45% соответственно). Заболеваемость ранним сифилисом в 2019 году составила 153 человека, в 2023 году – 161 человек. В 2019 году пик среди женщин наблюдался в возрасте более 50 лет (30,7%), среди мужчин – в возрасте 30-39 лет (38,6%). В 2023 году пик заболеваемости среди женщин наблюдалась в возрасте 40-49 лет (21,6%), среди мужчин – в возрасте 30-39 лет (29,1%). Заболеваемость первичным сифилисом и в 2019 году, и в 2023 году составила 13 человек; в 2019 году пик заболеваемости среди женщин наблюдался в возрасте 20-24 лет (50%) и 40-49 лет (50%), среди мужчин – в возрасте 40-49 лет (45,4%). В 2023 году пик заболеваемости среди женщин наблюдался в возрасте 18-28 лет (100%), а среди мужчин – в возрасте 25-29 лет (58,3%). Заболеваемость вторичным сифилисом в 2019 году составила 43 человека, в 2023 году она составила 64 человека. Пик заболеваемости вторичным сифилисом в 2019 году среди женщин был в возрасте 40-49 лет (50%), среди мужчин – в возрасте 30-39 лет (43,2%), в 2023 году для женщин пик заболеваемости пришелся на возраст 40-49 лет (33,3%), для мужчин – на возраст 20-24 лет (30,91%). Заболеваемость ранним скрытым сифилисом в 2019 году составила 97 человек, а в 2023 году – 101 человек; при этом в 2019 году пик заболеваемости среди женщин наблюдался в возрасте более 50 лет (35,48%), среди мужчин – в возрасте 30-39 лет (34,8%). В 2023 году пик заболеваемости среди женщин наблюдался в возрасте более 50 лет (22,2%) и 30-39 лет (22,2%), среди мужчин – в возрасте 30-39 лет (32,4%). Заболеваемость поздним сифилисом в 2019 году составила 252 человека, а в 2023 году – 930 человек. При этом в 2019 году пик заболеваемости среди женщин наблюдался в возрасте 40-49 лет (37,9%), среди мужчин – в возрасте более 50 лет (56,2%). В 2023 году пик заболеваемости среди женщин наблюдался в возрасте более 50 лет (48,8%), а среди мужчин – в возрасте более 50 лет (56,7%).

Выводы. Значительный прирост заболеваемости сифилисом в 2023 году, в основном, связан с манифестацией позднего сифилиса среди людей в возрасте старше 40 лет.