

*Алейнова В. В., Арещенко Д. С.*  
**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ  
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СКАРЛАТИНЫ  
У ПАЦИЕНТОВ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ И СТАЦИОНАРНОМ  
ЛЕЧЕНИИ**

*Научный руководитель ассист. Калачева О. В.*

*Кафедра инфекционных болезней*

*Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель*

**Актуальность.** На современном этапе для стрептококковой инфекции характерна ubicquitarность распространения, устойчивость возбудителя во внешней среде, множественность хозяев, принадлежность к индигенной флоре и высокая изменчивость (множество серологических вариантов). Скарлатина относится к неуправляемым инфекционным заболеваниям и встречается преимущественно в детском возрасте, но единичные случаи заболеваний бывают и среди взрослых.

**Цель:** проведение сравнительной характеристики структуры клинических проявлений скарлатины у пациентов при амбулаторном и стационарном лечении.

**Материал и методы.** Были изучены истории болезни 50 пациентов, находившихся на стационарном лечении в Гомельской областной инфекционной больнице в 2013 году, и 50 карт медицинского наблюдения, получавших лечение амбулаторно. Возраст заболевших составил от 1 до 8 лет. В структуре заболевших преобладают девочки: в амбулаторных условиях 74% (95% ДИ 59,87-88,13), в стационаре 58% (95% ДИ 39,72-76,28). Большая часть амбулаторных пациентов находилась в возрасте 4-6 лет (72%, 95% ДИ 57,33-86,67), в стационарных условиях преобладают дети 3-5 лет (84%, 95% ДИ 72,02-95,98).

**Результаты.** При сравнении клинических проявлений скарлатины у госпитализированных пациентов чаще встречались: «малиновый» язык ( $\chi^2=4,68$ ,  $p=0,031$ ), мелкоточечная сыпь на гиперемизованном фоне со сгущением в естественных складках, склонная к слиянию ( $\chi^2=34,3$ ,  $p=0,0001$ ), «пылающий» зев ( $\chi^2=1,37$ ,  $p=0,241$ ), увеличение регионарных лимфатических узлов ( $\chi^2=84,67$ ,  $p=0,0001$ ).

**Выводы:**

1. В структуре заболевших преобладают девочки (74% среди амбулаторных пациентов, 58% - среди госпитализированных).
2. Среди пациентов, проходивших лечение в амбулаторных условиях преобладают дети в возрасте 4-6 лет (72%, 95% ДИ 57,33-86,67), в стационарных условиях преобладают дети 3-5 лет (84%, 95% ДИ 72,02-95,98).
3. У госпитализированных пациентов со скарлатиной чаще, чем у амбулаторных пациентов встречались «малиновый» язык, мелкоточечная сыпь на гиперемизованном фоне со сгущением в естественных складках, склонная к слиянию, «пылающий» зев, увеличение регионарных лимфатических узлов.