

Михалюк Ю. В., Гудович А. В.

ФАКТОРЫ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ МОЛНИЕНОСНОЕ ТЕЧЕНИЕ ИНВАЗИВНЫХ ФОРМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Астапов А. А.

Кафедра детских инфекционных болезней,

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Менингококковая инфекция – заболевание с высокой смертностью, несмотря даже на своевременное и современное лечение, погибает 30% заболевших детей. Все имеющиеся случаи смерти – молниеносная форма менингококковой инфекции.

Цель: выявить причины молниеносного течения менингококковой инфекции у детей на основе данных лабораторных и инструментальных исследований у детей.

Материал и методы. Проведен анализ 51 истории болезни детей в возрасте до трех лет, причиной смерти которых явилось молниеносное течение менингококковой инфекции, находившихся на лечении в УЗ «ГДИКБ» г. Минска.

Результаты. После проведенного обследования установлены некоторые закономерности в процессе развития инфекции, позволяющие судить о правильности оказываемой помощи ребенку в условиях клиники и на догоспитальном этапе, своевременности введения антибактериальных препаратов, адекватности дозы, выбора группы препарата, а также выявлены некоторые особенности изменения клинико-лабораторных показателей.

Заключение. С целью свести к минимуму процент летальных исходов при менингококковой инфекции, необходимо более детально изучить вопросы, связанные с проблемами ранней диагностики менингита, своевременности доставки больного ребенка в стационар и скорейшего назначения адекватной дозы антибактериальных препаратов и гормонов.