

Казак Е. Г., Петровец Я. Ю.
**ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГЕМОФИЛИИ У ДЕТЕЙ**

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Шенец С. Г.

2-я кафедра детских болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Гемофилия является врожденным заболеванием, проявляющимся у лиц мужского пола геморрагическим синдромом гематомного типа, обусловленным дефицитом факторов крови VIII, IX, XI. Около 70 % больных страдают тяжелыми и среднетяжелыми формами гемофилии, при которых поражения опорно-двигательного аппарата носят прогрессирующий характер и служат основной причиной ранней инвалидизации.

Всемирная Организация Здравоохранения и Всемирная Федерация Гемофилии предлагают профилактическое лечение в качестве оптимального решения для людей, страдающих тяжелой формой гемофилии. Рекомендуются начинать профилактику уже в возрасте 1- 2 лет и продолжать её в течении всей жизни. Цель профилактики: перевести тяжелую форму гемофилии в среднетяжелую, достигнув минимального уровня дефицитного фактора $> 2\%$, а в некоторых случаях – и в легкую ($> 5\%$). Профилактическое лечение заключается во внутривенном введении концентратов факторов свертывания для предупреждения кровотечений.

Организация и проведение профилактического лечения является важнейшим направлением, позволяющим: предупреждать возникновение кровотечений/кровоизлияний; предотвращать повреждение суставов; уменьшать риск появления ингибиторов; исключать необходимость госпитализации, операционного вмешательства; улучшать качество жизни пациентов.