

*Исаенко А. В., Веремейчук М. Н.*  
**ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА  
ЮНОШЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС ПО МАТЕРИАЛАМ  
1-Й ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОЛИКЛИНИКИ Г. МИНСКА.**

*Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Адащик Н. Ф.  
Кафедра стоматологии детского возраста  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – функциональное заболевание ВНЧС, главными проявлениями которого являются привычный вывих и болевой синдром дисфункции. Чаще всего юношеская дисфункция встречается у девочек в возрасте 11-14 лет. Вследствие ускорения роста у подростков, наличия у них вегетососудистой дистонии, аномалий прикуса, возникновения травм, юношеская дисфункция ВНЧС имеет широкое распространение в этой возрастной группе. Не всегда удается выявить точную причину возникновения заболевания у подростков.

**Цель:** изучить особенности этиологии и патогенеза юношеской дисфункции ВНЧС по данным 1-й городской детской стоматологической поликлиники г. Минска.

**Материал и методы.** Проведено изучение стоматологических амбулаторных карт 26 пациентов в возрасте 12-16 лет, обратившихся в 1 ГДСП в 2012-2013 гг., которым был поставлен диагноз юношеская дисфункция ВНЧС.

**Результаты.** Проведен анализ данных об этиологии и патогенезе юношеской дисфункции ВНЧС, сопутствующих заболеваниях пациентов. Выявлены наиболее распространенные причины заболевания, а также факторы риска его возникновения, такие как быстрый рост, недавно проведенное ортодонтическое лечение, наличие аномалий прикуса, инфекционные заболевания, травмы челюстно-лицевой области.

**Выводы:**

1. Данные, полученные в результате исследования, подтверждают сведения мировой литературы по вопросам этиологии и патогенеза юношеской дисфункции ВНЧС.
2. Врачам-стоматологам необходимо уделять больше внимания профилактике заболеваний ВНЧС у подростков.