

Белый А. Г., Михнёнок Ю. Ю.

**НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ЭМАЛИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ:
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФАКТОРАМИ РИСКА СТОМАТОЛО-
ГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Козловская Л. В.

Кафедра стоматологии детского возраста

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Цель: оценить возможности минимизации факторов риска стоматологических заболеваний у детей с несовершенным амелогенезом.

Материал и методы. Объектом наблюдения были 3 детей с наследственной патологией эмали зубов, у которых мы выявили особенности клинической картины гипопластического типа несовершенного амелогенеза. Качество гигиены полости рта у детей проводили, используя протокол О'Лири. Кариесрезистентность эмали оценивали с помощью ТЭР-теста. Подобраны индивидуальные средства гигиены полости рта и дополнительные методы чистки зубов. Реминерализующую терапию проводили с использованием зубной пасты R.O.C.S. medical 5000 ppm согласно инструкции.

Результаты. Выявлены особенности клинической картины гипопластического типа несовершенного амелогенеза у наблюдаемых пациентов. Анализ данных показал улучшение качества гигиены полости рта у детей. Повышена кариесрезистентность эмали, достигнута положительная динамика результатов ТЭР-теста. На основании клинической картины и полученных результатов исследования индивидуально для каждого пациента подобран дополнительный метод чистки зубов. Наши исследования реминерализующих свойств зубной пасты с повышенным содержанием фтора R.O.C.S. medical 5000 ppm свидетельствуют о том, что она является высокоэффективным профилактическим продуктом.

Заключение. Таким образом, у пациентов с несовершенным амелогенезом вполне возможна минимизация факторов риска стоматологических заболеваний при условии индивидуального подхода, динамического наблюдения с регулярными мотивацией и контролем гигиены полости рта, а также качественной фторпрофилактикой.