

**Чоканару В. В.**

**СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА  
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Блахов Н. Ю.*

*Кафедра военно-полевой хирургии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Число больных острым панкреатитом неуклонно растет и, по разным данным составляет 200-800 на 1 млн. населения в год. О высоких цифрах заболеваемости сообщают как отечественные, так и зарубежные авторы. Синдром системного воспалительного ответа – показатель, характеризующий тяжесть течения заболевания. Процесс носит фазовый характер, зависящий от масштабов поражения и формы некроза поджелудочной железы.

**Цель:** определить степень развития синдрома системного воспалительного ответа у больных с различными формами острого панкреатита.

**Материал и методы.** Проведен анализ 50 историй болезни пациентов, проходивших лечение в 432 ГВК МЦ ВС с 2007 г. по 2013 г. по поводу острого панкреатита. В качестве данных использовались показатели, характеризующие развитие синдрома системного воспалительного ответа.

**Результаты.** Проведен анализ данных, составлены графики маркеров, характеризующих развитие синдрома системного воспалительного ответа, на основании которых можно судить о времени и тяжести развития процесса.

**Выводы:**

1. Лишь у незначительного количества пациентов с отечной формой острого панкреатита развивается синдром системного воспалительного ответа (20%).

2. У пациентов с неинфекционным некрозом поджелудочной железы синдром системного воспалительного ответа развивается в 53 % случаев, но при своевременно начатом лечении процесс идет на убыль.

3. У 100% пациентов с инфекционным некрозом поджелудочной железы развивается синдром системного воспалительного ответа, чаще тяжелый, имеющий 4 маркера (40%).