

Прошутинская К. С.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ В Г. МИНСКЕ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Иванова Т. Е.

Кафедра военно-полевой хирургии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. В странах Европейского региона ВОЗ (в который входит и Беларусь) от проблем избыточной массы тела страдают 30-80% взрослых. Хирургическое лечение ожирения и метаболического синдрома является единственной мерой, доказавшей свою эффективность в снижении избыточной массы тела у больных особенно с морбидным ожирением на длительный срок.

Цель: оценить эффективность хирургического метода лечения у пациентов с морбидным ожирением.

Материал и методы. Ретроспективно исследовано 138 историй болезни пациентов с ожирением, которые получили лечение в городском центре герниологии и бариатрической хирургии в 2012-2013 гг. Статистический анализ данных был проведен с помощью программы Microsoft Excel 2010.

Выводы:

1. Илеошунтирующая операция, бандажирование желудка с частичной илеошунтирующей операцией являются эффективными методами хирургического лечения морбидного ожирения.
2. Дерматолипэктомия является вторым этапом комплексного лечения ожирения и проводится после значительной потери избыточной массы тела.