

*Кондратенков И. В.*

**ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ОСЛОЖНЕННОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ**

*Научный руководитель ассист. Толстов Д. А.*

*Кафедра военно-полевой хирургии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Варикозная болезнь ног является распространенными заболеваниями нижних конечностей. В ряде случаев у больных развивается хроническая венозная недостаточность 3-й степени, которая клинически проявляется формированием трофических язв. Для лечения этой категории больных применяется большое количество средств и методов – медикаментозных, местных, хирургических.

Хирургическое лечение является одним из основных способов предотвращения прогрессирования заболевания. Среди хирургических методов используются как классические экстракционные методики (флебэктомия по Бэбкокку, Нарату, Коккету), так и миниинвазивные (эндовенозная лазерная коагуляция, флебэктомия по Вареди, радиочастотная абляция, склерозирование).

Использование хирургического лечения у пациентов с уже развившимися трофическими язвами в большинстве случаев приводит к заживлению дефектов кожи в отдаленном периоде и предотвращению рецидива их возникновения.

РЕПОЗИТОРИЙ