

*Цалко Н. А., Семеняко А. А.*  
**ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ**  
*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Курченкова В. И.*  
*2-я кафедра внутренних болезней*  
*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** На фоне таких распространенных и тяжелых осложнений цирроза, как печеночная энцефалопатия и кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода, бактериальная инфекция отступает во многих случаях как бы на второй план. В то же время инфекционные осложнения наблюдаются у 38 – 47% больных циррозом и служат непосредственной причиной смерти приблизительно у 1/4 больных. Основными причинами такого положения являются слабая выраженность, а нередко и полное отсутствие симптоматики микробной инфекции (лихорадки, озноба, лейкоцитоза), наряду с недостаточной настороженностью врача в плане ее своевременной диагностики.

**Цель:** выявить особенности инфекционных осложнений у больных с циррозом печени.

**Материал и методы.** В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни на базе УЗ «9 ГКБ» г. Минска за период 2010-2013 гг. Критерием включения в исследование было наличие диагноза цирроз печени и инфекционных осложнений.

**Результаты.** На основании критерииов Child-Pugh в 1-ю группу вошли 2 (6,67%) больных ЦП, класс В, во 2-ю - 28 (93,33%) пациентов с циррозом печени, класс С. Преобладало число пациентов с алиментарно-токсической (60%) этиологией процесса. Из них подавляющее большинство были мужчины - 73,34%. Большинство пациентов принадлежат к возрастной группе старше 55 лет (53,34%). Из выявленных инфекционных осложнений чаще всего встречались пневмонии ( 61,91%), эмпиемы плевры ( 21,42%), реже встречались пневмонефрит(6,67% ) и бактериальный эндокардит (6,67%), и осложненный отит среднего уха (3,33%).

**Выводы:** к группе риска по развитию инфекций следует отнести пациентов с ЦП класса С по Child-Pugh алиментарно-токсической и смешанной этиологии, с частой госпитализацией по поводу декомпенсации заболевания печени, с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода (в анамнезе).