

Федотко Е. В.
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Барановская Е. И.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. На сегодняшний день наблюдается рост числа преждевременных родов, что является одной из важнейших проблем современного акушерства и неонатологии, для которой характерны высокие показатели перинатальной заболеваемости и смертности. Также эта проблема имеет экономическую сторону, так как на её решение во всем мире ежегодно тратятся огромные денежные средства, особенно на медикаменты и оборудование.

Цель: определить структуру акушерских и медико-социальных факторов, вызывающих преждевременные роды.

Материал и методы. Проведен проспективный анализ 77 историй родов (27 преждевременных родов – основная группа; 50 срочных родов – контрольная группа), проведенных на базе акушерского обсервационного отделения 2 ГКРД в 2013 – 2014 годах. Также проведено анкетирование женщин по поводу их информированности о своей беременности и предстоящих родах.

Результаты. Проведен анализ полученных данных, в ходе которого выявлены наиболее частые причины возникновения преждевременных родов: истмико-цервикальная недостаточность – 15%, инфекционный фактор – 48%, многоплодная беременность – 15%, гестоз – 15%, аномалии развития матки – 7%. В контрольной группе инфекционный процесс, возникший до 30 недель гестации, встречается у 76% женщин, что не помешало им родить в сроке после 37 недель беременности.

В основной и контрольной группе брак зарегистрирован у 93% и 96% женщин соответственно. У 81% женщин с преждевременными родами данная беременность была запланированной (в контрольной группе 78%). Прегравидарную подготовку выполнили 26% женщин из основной группы (28% из контрольной). В основной группе 15% женщин составили возрастные первородящие (в контрольной – 10%). Высшее образование имеют 59% женщин из основной группы и 88% из контрольной.

Выводы:

1. В этиологии преждевременных родов преобладает инфекционный фактор, соответственно для его снижения необходимо более тщательно проводить прегравидарную подготовку, а также своевременно лечить воспалительные процессы до и во время беременности с контролем эффективности данного лечения.
2. Образовательный уровень и степень информированности женщин имеет прямую связь с благоприятным течением беременности и родов.
3. Чем в более раннем сроке беременности возникает инфекционный процесс, тем ранее запускается процесс родов.