

Козел И. С.

**КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧЕНЬ РАННИХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ**

Научный руководитель д-р мед наук, проф. Барановская Е. И.

Кафедра акушерства и гинекологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Доля преждевременных родов в Республике Беларусь составляет 4-8 %, в сроке гестации 22-28 недель 1-2 % и не имеет тенденции к снижению. Причинами высокой смертности новорожденных, родившихся на сроках меньше 28 недель, являются незрелые легкие, экстремальная масса тела, внутричерепные кровоизлияния, сопутствующие инфекции.

Цель: проанализировать причины, клиническое течение и исход преждевременных родов на сроке гестации 22-28 недель.

Материал и методы. Проанализированы 10 историй родов женщин, поступивших со спонтанно начавшимися и угрожающими преждевременными родами в городской клинический родильный дом № 2 г. Минска и родивших на сроках 22-28 недель в 2013 г.

Результаты. Средний возраст женщин 29 лет. Сопутствующие соматические заболевания имели 80% женщин. Первородящих 60% женщин. Акушерский анамнез отягощен у 50% женщин: прерывание беременности по медико-генетическим показаниям было у 3-х, самопроизвольный выкидыш – у 1, данная беременность вследствие ЭКО у 1 женщины. Беременность осложнялась угрозой прерывания (n=6), поздним гестозом (n=1), плацентарной недостаточностью (n=3), анемией легкой степени (n=8). Двойня была в 2 случаях. Установлены причины недонашивания: органическая истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН, n=2), аномалия развития матки (n=1), эндокринная патология (n=1), внутриматочная инфекция (n=6). Естественные роды произошли у 6 женщин, кесарево сечение выполнено 4-м. Гистологически в плаценте в 5 случаях выявлено гнойное воспаление, в 4-х ускоренное созревание ворсин хориона, в 1-м незрелая плацента. Масса новорожденных составила от 650 до 1160 г., длина тела от 28 до 37 см. Перинатальные потери составили 30%: антенатально погибли 2 плода, 1 ребенок умер в раннем неонатальном периоде.

Выводы:

1. Значимыми причинами преждевременных родов на сроке 22-28 недель явились внутриматочная инфекция, ИЦН, многоплодие.
2. Патология новорожденных обусловлена их незрелостью, проявлялась респираторным дистресс синдромом, дыхательной недостаточностью, асфиксий тяжелой степени и не связана со способом родоразрешения.
3. Очень ранние преждевременные роды связаны с высокими перинатальными потерями. Причиной антенатальной гибели плода явились асфиксия тяжелой степени, ранняя неонатальная смерть наступила вследствие геморрагических осложнений при сопутствующих множественных пороках развития и на фоне асфиксии тяжелой степени.