

**Астапович Т. Л.**  
**ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ**  
**НЕДОСТАТОЧНОСТИ**

**Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Можейко Л. Ф.**

*Кафедра акушерства и гинекологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Основные задачи акушерства – создание оптимальных условий для осуществления женщиной функции материнства, сохранение ее здоровья и обеспечение рождения здорового потомства. Несмотря на достижения современного акушерства, отмечается тенденция к увеличению числа врожденных заболеваний, детерминированных моррофункциональными нарушениями в фетоплacentарной системе, в особенности у беременных с отягощенным акушерско-гинекологическим и соматическим анамнезом, а также осложненным течением беременности.

**Цель:** определить факторы риска, приводящие к нарушениям в фетоплacentарной системе, а также перинатальные исходы и заболеваемость новорожденных при указанной патологии на основании данных ретроспективного исследования.

**Материал и методы.** Ретроспективное исследование проведено с использованием архивного материала, включающего данные 29 историй родов женщин и развития новорожденных, статистических журналов в УЗ «1 ГКБ» с 2009 по 2012 годы.

**Результаты.** Основную группу высокого перинатального риска составили женщины с привычной потерей беременности в анамнезе, выявленными генитальными инфекциями и переношенной беременностью. По данным ретроспективного исследования частота аспирационного синдрома, дыхательных расстройств, гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы и травм у новорожденных составила 6,7%, 2,37%, 34%, и 1,99% соответственно. Внутриутробная инфекция отмечена у 3,73% новорожденных.

**Вывод:** женщины с привычной потерей беременности в анамнезе, выявленными генитальными инфекциями и переношенной беременностью составляют группу высокого перинатального риска, что диктует необходимость в проведении ранней диагностики нарушений состояния плода и своевременной их коррекции с целью исключения перинатальных потерь, снижения перинатальной заболеваемости и смертности.