

*Ковалёва В. В., Яцковская А. А.*  
**СТРУКТУРА И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА  
ПРИ ПОЗДНЕМ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  
ПАЦИЕНТОВ**

*Научные руководители ст. преп. Куницкая С. В.,  
ассист. Иванова М. А.*

*Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,  
Кафедра инфекционных болезней  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** В республике на 1 февраля 2014 года проживало, согласно официальным данным отдела профилактики СПИД ГУ «Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», 12404 пациента с диагнозом ВИЧ-инфекция. Своевременное выявление заболевания позволяет пациентам вести обычный образ жизни, при условии выполнения рекомендаций врача. Согласно результатам зарубежных исследователей качество и продолжительность жизни таких пациентов сопоставимы с таковыми у пациентов, страдающих сахарным диабетом. Позднее выявление ВИЧ-инфекции существенно затрудняет процесс лечения и увеличивает стоимость терапии.

**Цель:** оценить экономический ущерб от позднего выявления ВИЧ-инфицированных пациентов.

**Материал и методы.** Объект исследования – 51 пациент с поздно установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, получавшие лечение на базе УЗ «Минская городская клиническая инфекционная больница». Срок проведения наблюдения: январь 2008 года – декабрь 2012 года. Методы исследования – статистический, метод VEN-анализа.

**Результаты.** Значение медианы возраста пациентов с поздно выявленной ВИЧ-инфекцией составило 36 лет (интерквартильная широта – от 31 до 41 года). Возраст пациентов-мужчин (медиана и интерквартильная широта) – 37 лет (от 32 до 42 лет), женщин, соответственно – 35 лет (от 30 до 40 лет). Распределение по полу: мужчины – 72,5% (37 человек), женщины – 27,5% (14 человек).

Все госпитализированные пациенты получали лечение и обследования согласно протоколу. Первоначально 9,4% пациентов были доставлены в стационары неинфекционного профиля. При анализе лекарственных препаратов, назначенных пациентам для лечения, установлено, что к группе жизненно важных (V) относятся 74 препарата (96%). К группе второстепенных (N) – 3 препарата, что составляет около 4 % от используемых лекарственных средств. В структуре затрат на обследование и лечение пациентов с поздно установленным диагнозом ВИЧ-инфекция расходы на препараты класса V составили 99,9% (около 31,021 млн. бел. руб. от общей суммы в 31,068 млн. бел. руб.), на препараты класса N – 0,1% (47,6 тыс. бел. руб.) без учета наркотических и некоторых других лекарственных препаратов.

**Заключение.** Основные затраты при проведении лекарственной терапии связаны применением препаратов из группы жизненно важных.