

Фармакотерапия у детей: взгляд педиатров и мам

Романова И.С.¹, Сачек М.М.², Мардас Д.М.²,
Гавриленко Л.Н.¹, Кожанова И.Н.¹, Чак Т.Н.¹

¹Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь;

²Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Республика Беларусь

Было проведено анкетирование 1429 женщин, имеющих детей и педиатров (58 врачей) на специализированном портале matargo.by. Средний возраст женщин составил 30,7 лет. 97,8% респонденток — жители Беларуси. На вопрос «Кому Вы доверяете в вопросах выбора лекарственного препарата (ЛП) при лечении Вашего ребенка?» 37,8% женщин однозначно ответили — врачу; 52 — собственному опыту; 3 — работнику аптеки; 58,5% женщин выбрали несколько ответов (врач, знакомые, работник аптеки, собственный опыт, реклама и др). Только 27,7% мам указали, что следуют рекомендациям врача, в то время как 63,6% — не следуют, а остальные ответили неоднозначно. Было получено 446 указаний на нежелательные реакции при приеме детьми ЛП, из которых 33,6% связаны с антибиотиками. 104 случая нежелательных реакций были описаны для 54 наименований ЛП. На вопрос «Соблюдали ли Ваши пациенты Ваши рекомендации по лечению?» однозначно «да» получено 39 ответов (67,2%). Степень приверженности к рекомендациям составила в среднем — 7,7 балл из 10. Только 13 врачей (22,4%) встречали нежелательную реакцию на ЛП (в основном на антибиотики), а извещение о нежелательной реакции заполнили только пять человек. На вопрос: «Ваша тактика при подозрении на нежелательную реакцию на ЛП?» получено 66 ответов. Отмена препарата указана в 27 ответах, отправить извещение о нежелательной реакции на ЛП — 14, симптоматическое лечение — 7 и 27,2% дали единичные ответы (сообщить главному врачу, госпитализация, оказание неотложной помощи, смена препарата, сообщить клиническому фармакологу, сообщить производителю препарата, наблюдение за пациентом, запись в карте, снизить дозу). Сегодня население имеет в свободном доступе обилие информации и определенное представление о наиболее распространенных симптомах заболевания, подходах к их лечению, применяемым ЛП, а внушительный ассортимент безрецептурных ЛП и парафармацевтических продуктов делает процесс самолечения не только возможным, но и очень распространенным. Остро стоит вопрос об упорядочении ситуации с самолечением посредством информационного обеспечения в первую очередь наиболее уязвимых групп населения, к которым необходимо отнести детей. С целью повышения грамотности врачей и пациентов по вопросам безопасного потребления лекарственных препаратов, была создана платформа МАМА PHARM (mama-pharm.com), позволяющая уточнить особенности применения ЛП в зависимости от возраста.



АССОЦИАЦИЯ
ПЕДИАТРОВ-ИНФЕКЦИОНИСТОВ

2022
Том 21

Спецвыпуск 2

ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ



XXI Конгресс
детских инфекционистов
России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ
И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

15—16 ДЕКАБРЯ, 2022 ГОДА, Г. МОСКВА