

Сиразтдинова А.И., Канаиш К.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АНОГЕНИТАЛЬНЫМИ БОРОДАВКАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Навроцкий А.Л.

Кафедра кожных и венерических болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Актуальность данного исследования состоит в распространенности заболевания среди населения, особенно молодежи, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на репродуктивное здоровье. Аногенитальные бородавки (АБ), вызываемые вирусом папилломы человека, занимают значительное место среди заболеваний, вызванных инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем. Установлено, что 16, 18, 31, 33 типы вируса папилломы человека, вызывающие АБ, обладают высоким канцерогенным риском.

Цель: изучить возрастную-половую и территориальную характеристики заболеваемости аногенитальными бородавками в Республике Беларусь за 2013-2022 годы.

Материалы и методы. В работе использована Государственная статистическая отчетность "Число зарегистрированных случаев заболеваний инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем, микозами и инфестациями», форма №1- ИППП (Минздрав) за 2013-2022 годы. При помощи Excel проанализированы и представлены в виде графиков, таблиц и диаграмм статистические данные о заболеваемости аногенитальными бородавками в Республике Беларусь за 2013-2022 годы.

Результаты и их обсуждение. Изучены возрастная-половая и территориальная особенности заболеваемости АБ в Республике Беларусь за 2013 - 2022 годы. В целом в стране наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости ИППП, в том числе и аногенитальными бородавками. Удельный вес заболеваемости данной патологией среди всех ИППП за 10 лет незначительно снизился (на 0,39%). Наиболее высокий уровень заболеваемости в Республике Беларусь наблюдался в 2013 году, когда число заболевших составило 3207 человек. Среди регионов максимальный показатель наблюдался в Минске в 2013 году (636 случаев). Анализ по полу показал, что в два раза чаще болели женщины, а пик заболеваемости приходился на возраст 20 - 24 года (401 заболевший).

Выводы. В Республике Беларусь в 2013-2022 гг. наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости ИППП, в том числе аногенитальными бородавками. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в 2013 году. Среди регионов максимум заболевших наблюдался в Минске в 2013 году. В два раза чаще болели женщины, что особенно характерно для возрастной группы 20 - 24 года.