

Максимович Е.В.

ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

Научный руководитель: Колесникова С.Н.

*Кафедра оториноларингологии с курсом повышения квалификации и переподготовки
11-я городская клиническая больница г. Минска*

Актуальность. По данным Белорусского канцер-регистра на долю пациентов со злокачественными новообразованиями околоносовых пазух приходится 0,2% всех вновь выявленных злокачественных новообразований в Республике Беларусь и около 3-5% злокачественных новообразований, поражающих верхние дыхательные пути. Редкость патологии создает объективные трудности для формирования клинической настороженности среди врачей. Однако проблема заключается не только в редкости, но и в систематической поздней диагностике: по данным исследований, доля выявленных случаев в I–II стадии не превышает 9,1%.

Цель: оптимизировать подходы к ранней диагностике злокачественных новообразований околоносовых пазух.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные 579 пациентов со злокачественными новообразованиями ЛОР-органов, пролеченных в оториноларингологическом отделении УЗ «11-я городская клиническая больница» г. Минска в период 2020–2025 гг. Из них методом ретроспективного анализа были отобраны пациенты с гистологически верифицированным диагнозом злокачественных новообразований околоносовых пазух. Проведен расчет доли пациентов с данной локализацией в структуре всей ЛОР-онкопатологии, выполнена описательная статистика.

Результаты и их обсуждение. За анализируемый 5-летний период среди 579 пациентов со злокачественными новообразованиями ЛОР-органов доля пациентов со злокачественными новообразованиями околоносовых пазух составила 2,6% (n=15). Анализ распределения по стадиям злокачественного процесса у пациентов данной группы показал, что в 33,3% случаев (n = 5) заболевание было выявлено на I–II стадиях, а у 66,7% пациентов (n = 10) заболевание выявлено на III–IV стадиях.

Выводы. Преобладание запущенных форм злокачественных новообразований околоносовых пазух (66,7%) показывает необходимость повышения онкологической настороженности у врачей амбулаторного звена. Таким образом, проблема раннего выявления злокачественных новообразований околоносовых пазух является не только клинической, но и организационной, требующей комплексного подхода к повышению квалификации врачей и совершенствованию диагностических алгоритмов.

Для улучшения ранней диагностики рекомендовано: 1) повышение онкологической настороженности врачей первичного звена в отношении односторонних, резистентных к терапии риносинуситов; 2) проведение эндоскопического исследования полости носа и околоносовых пазух с биопсией при односторонней назальной симптоматике; 3) раннее использование лучевых методов (КТ/КЛКТ) в диагностике заболеваний околоносовых пазух; 4) сокращение сроков от первичного обращения до специализированной консультации врача-онколога.